



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Adolfo Angel Pascual Gómez

Nombre del tema: Instalación de catéter venoso periférico

Parcial: III

Nombre de la Materia: Práctica clínica de enfermería

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodriguez

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: Sexto cuatrimestre



Comitán de Domínguez, Chiapas a 08 de julio del 2023

Adolfo Anzel
Practica clinica
de enfermeria
3 parcial
08/07/2023

Venoclisis

Es la administración de fármacos diluidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo continuo o intermitente.

Infusiones

Infusión intermitente

El medicamento que se administra será diluido en una pequeña cantidad de solución fisiológica o dextrosa y será transfundido entre 30 minutos o más dependiendo del medicamento.

Infusión continua

El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 horas, el volumen de dilución dependerá del tipo de medicamento desde 100 ml o más

Bolo endovenoso

Dosis relativamente de una medicación administrada por vía endovenosa en un corto espacio de tiempo, normalmente entre 1 y 30 minutos.

Indicaciones

- ✓ Colocar el catéter venoso periférico está indicado en las siguientes situaciones:
- ✓ Administración de tratamiento farmacológico endovenoso
- ✓ Hidratación endovenosa en px con intolerancia oral.
- ✓ Reanimación con soluciones endovenosas en px en estado de shock
- ✓ Transfusión de hemoderivados.

Procedimiento

- ✓ Lavado de manos
- ✓ Colocarse los guantes estériles
- ✓ Elegir vena
- ✓ Limpiar el sitio de punción con una torunda embebida de alcohol
- ✓ Ligar el brazo del px en la zona más proximal
- ✓ Una vez canalizada (el cual se evidencia por la salida de sangre por la aguja metálica) progresar unos milímetros para posteriormente ingresar el abocath sin la aguja.
- ✓ Soltar ligadura
- ✓ Conectar la llave de tres vías con la extensión la cual debe estar purgada con suero fisiológico
- ✓ Fijar el abocath con tegaderm o cinta de tela en forma prolija.
- ✓ Escribir fecha de colocación de la vía y nombre del enfermero
- ✓ Administrar medicamentos o tratamiento médico indicada
- ✓ Lavado de manos
- ✓ Registrar el procedimiento

Materiales

- Riñonera o bandedo estéril
- Campo estéril
- Torundas de alcohol
- Jeringas de 5ml
- Suero fisiológico
- Catéter venoso periférico de varios calibres (24, 22, 20, 18, 16).
- Llave de triple vía con extensión

- Tegaderm de 6x7 o 10x12 cm
- Guantes estériles
- Ligadura
- Alcohol medicinal al 70°, también puede ser alcohol yodado.

Bibliografía

UDS. (2023 periodo mayo-agosto). *practica clinica de enfermeria*. comitan de dominguez.