



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del Alumno: Yaneth Beatriz Álvarez Santiz.

Nombre del tema: Instalación de catéter venoso periférico

Parcial: 3er.

Nombre de la Materia: práctica clínica I

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to.

Lugar y fecha: Comita de Domínguez, a 08 de julio de 2023

# Instalación de Catéter Venoso Periférico

Venoclisis.

Es la administración de fármacos diluidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo continuo o intermitente.

- Infusiones.

- Intermitente

El medicamento será diluido en pequeña cantidad de Sol. Fisiológica o dextrosa y se transfundirá el tiempo que indiquen.

- Continua.

El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 horas, el volumen de dilución dependerá del tipo de medicación.

- Bolo endovenoso


Dosis relativamente alta de una medicación administrada por vía endovenosa en un corto espacio de tiempo, normalmente entre 1 y 30 minutos.

- Indicaciones

Colocación de CUP esta se utiliza para administrar tratamiento farmacológico endovenoso hidratación endovenosa en paciente con intolerancia oral, transfusión de hemoderivados.

- Material

Campo estéril, bandeja, torundas alcoholadas, Jeringa de 5ml, suero fisiológico, catéter, tegaderm, guantes, ligadura.



## Bibliografía

2023, U. (s.f.). *Antología de Enfermería Medico Quirurgico II*. Obtenido de  
file:///C:/Users/yaneth/Downloads/ENFERMERIA%20MEDICO%20QUIRURGICO%20II.pdf