



Nombre de alumno: FATIMA LIZBETH PONCE SOBERANO

**Nombre del profesor: MARIA CECILIA ZAMORANO
RODRIGUEZ**

Materia: PRACTICA CLÍNICA

Grado: 6TO CUATRIMESTRE

Grupo: A

Instalación de catéter Venoso Periférico


Venoclisis

Es la administración de fármacos diluidos por vía Endovenosa mediante un sistema de goteo continuo o intermitente.



Infusión intermitente

El medicamento que se administra será diluido en una pequeña cantidad de solución fisiológica o dextrosa y será transfundido entre 30 minutos o más dependiendo el medicamento.



Infusión Continua

El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 horas, el volumen de dilución dependerá del tipo de medicación administrada desde 100 ml o más.



Bolo endovenoso

Dosis relativamente alta de una medicación administrada por vía endovenosa en un corto espacio de tiempo, normalmente entre 1 y 30 minutos.



Indicaciones

- La Colocación del Catéter Venoso Periférico está indicado, siguientes Situación
- Administración de tratamiento farmacológico endovenoso
- Hidratación endovenosa en paciente con intolerancia oral
- Reanimación con soluciones endovenosas en pacientes en estado de Shock
- Transfusión de hemo derivados
- Procedimiento de colocación venoso Periférico

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rinón o bandeja estéril • Campo estéril • Torundas de algodón • Jeringas de 5ml | <ul style="list-style-type: none"> • Suero fisiológico • Catéter venoso • llave de 3 vías • Tegaderm | <ul style="list-style-type: none"> • Loxidaca • alcohol • Guantes esteriles |
|--|--|--|

BIBLIOGRAFÍA

1. Perry Potter Habilidades y procedimientos en enfermería, Mc Graw Hill, (2014).
3. Sorrentino Remmer fundamentos de enfermería práctica, cuarta edición, mc graw hilli (2015).
4. Perrey Potter fundamentos de enfermería, Mc Graw Hill, (2014).
5. Guías para enfermería para práctica clínica.(<https://www.youtube.com/watch?v=ZPou8Oxf0Xg>) Enfermería trabajo en equipo.