



**Nombre de alumno: Carlos Enrique
Maldonado Juárez**

**Nombre del profesor: María del
Carmen López silba**

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: patología del adulto

PASIÓN POR EDUCAR


Grado: 6to

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Enero de 2020.

Problemas
digestivos

1.5



1.5.1

Problemas
esofágicos
Enfermedad por
reflujo
gastroesofágico

Se define
como

los síntomas
más característicos
son

regurgitación
acida en el
pecho

El paso del
contenido gástrico
al esófago de forma
espontánea

Ardez
y/o la regurgitación
acida.

Se da cuando los
fluidos gástricos ascienden
vaciando hacia la
boca

En ausencia de
algo que lo
produzca

Es una sensación de dolor, ardor
también conocida como pirosis. Se
siente detrás del esternón y aparece
cuando el contenido gástrico pasa al
esófago produciendo irritación de la
mucosa

Al
igual que

Dolor de pecho, juergas
dolor de garganta y afonía
por irritación

1.5.2
problemas
gastro
gastro
ulera
gastro
ulera
ulera
gastro

La gastritis es la inflamacion de la membrana que recubre el estomago

Al igual que depende de si se multiplica o no en el tiempo

Entre 2 tipos

Aguda

crónica
Consumo continuo de alcohol, tabaco

La ulera gastrica es conocida como ulera peptica

causa clasicamente dolor quemante o relaciones con frecuencia de amical nocturna

Se alivia de manera rapida con la ingestion de alimentos o antiacidos

Cancer del estomago aparece como consecuencia de una proliferacion anormal de celulas en cualquier parte del estomago

Puede ser benigno o maligno

En 90% de las casos se deben al adenocarcinoma gastrico

Suele surgir como consecuencia de una completa interaccion entre la afeccion por Helicobacter pylori

1.5.3

Problemas del tracto intestinal
colitis ulcerosa
cancer de colon
ostomias

La colitis ulcerosa es una enfermedad que causa inflamación y úlceras en la membrana que recubre el recto y el colon

Permanece a un grupo de enfermedades llamadas enfermedad intestinal inflamatoria

Los pacientes con UC de larga duración tienen mayor riesgo de presentar displasia epitelial del colon y carcinoma

El cancer de colon se desarrolla a partir de adenomas de colon precursos, y el cancer colorectal

Se puede evitar detectando y resecando los polipos adenomatosos del colon.

Las personas con mayor riesgo de cancer de colon incluyen aquellos con el antecedente familiar de polipos adenomatosos o cancer.

Ostomias es una exteriorización del intestino en la pared abdominal realizada con el objetivo de

Podar evacuar las heces debido a un problema medico que impide el movimiento

1.5.4

Problemas abdominales
Enfermedad disociadora
apendicitis aguda
hernias

La diverticulosis del colon es un problema común que afecta a personas de 60 años de edad

La incidencia máxima de apendicitis aguda se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida

Una hernia es un saco formado por el desplazamiento de la cavidad abdominal

Son bolsos que se forman en las paredes de colon, normalmente en la parte izquierda o colon sigmoide

Puede ocurrir a cualquier edad

Pun que se han sugerido causas dietéticas, como el cambio de hábitos dietéticos, la alteración de la microflora intestinal

Es más común en personas que residen en áreas rurales

El Saco para a través de un orificio o are débil

En la cara frente de la pared abdominal

Tipos de hernia

- Hernia Femoral
- Hernia inguinal
- Hernia Umbilical

15.9
Problemas de riego
y ano
Hemorroides
Esfera anal
Fistulas anales

Los hemorroides tambien
llamadas dilataciones, son venas
hinchadas en el ano y la parte
inferior del recto

La fisura anal es un
pequeño desgano en el
tejido algubio y humido
(mucosa)
una fistula anal es el
termino medico para un
focal infectado que se
desarrolla

Semilares a los venas varicosas
Pueden desarrollarse dentro
del recto (hemorroides
internas)
o debajo de la piel
(hemorroides externas)

Puede producirse cuando
evacuas en bancos y duros
heces. Suelo provocar dolor
y sangrado

Su prevalencia es igual
en mujeres y varones, se asocia a
estreñimiento, diarrea, infecciones
causales

En la piel y la abertura muscular
al focal del tubo digestivo (ano)
Se define como la comunicacion anormal
de una cavidad de dentro del conducto anal
identificable dentro del conducto anal
debe ser con un orificio interno

BIBLOGRAFIA

(S/f). Com.mx. Recuperado el 20 de mayo de 2023, de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/c5eb7bdaa7a7049e425d41efbcf75b30-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>

