



**Nombre del alumno: José Fernando Aguilar
Gómez**

**Nombre del profesor: María Del Carmen
López silba**

Nombre del trabajo: Ensayo

Materia: Patología Del Adulto

Grado: Sexto cuatrimestre

Grupo: A

INFECCIÓN URINARIA

Las Infecciones urinarias son la infección bacteriana más frecuente en la población anciana. Su prevalencia aumenta con la edad porque el envejecimiento produce cambios en los mecanismos de defensa frente a la infección. manifestaciones clínicas suelen ser menos específicos, de presentación más grave y de peor pronóstico. Infección del tracto urinario no complicada: se manifiesta como cistitis aguda o pielonefritis aguda sin alteraciones anatómicas o funcionales de órganos en una persona previamente sana Orina. Bacteriuria asintomática: se da por un número determinado de aislados Suficiente cantidad de bacterias causantes de infecciones (recuentos) en la muestra de orina Obtenido de una persona sin signos o síntomas de una UTI. Cistitis aguda: Es una inflamación sintomática de la vejiga, generalmente de la Bacteriana, caracterizada por polaquiuria, urgencia, disuria, dolor suprapúbico y urgencia vejiga.

La mayoría de las IVU son causadas por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. La infección se desarrolla con mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. La mayoría de las veces, el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer IVU.

Las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano que en los hombres. Debido a esto, las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar un diafragma para el control de la natalidad. La menopausia también aumenta el riesgo de una IVU.



CANCER VESICAL Y DERIVACIONES URINARIAS

El cáncer de vejiga ocurre en las células que forman la vejiga empiezan a salirse de control. a medida que se desarrollan más células cancerígenas, estos pueden formar tumores y diseminarse a otras partes del cuerpo, las condiciones que pueden causar desviación urinaria son: defectos de nacimiento, Infecciones, tumores, otras obstrucciones (no controladas) Conservador). Hay varios tipos de derivación urinaria, el más común es un catéter ileal, que incluye una sección de intestino extraída y aislada del tracto gastrointestinal (GI). A Se sutura un extremo del tubo y se lleva el otro extremo a la superficie de la piel, este nuevo orificio se llama estoma. La orina todavía es producida por los riñones, fluye a través del uréter.

El uréter se conecta a esta parte del intestino, Permita que la orina fluya a través de la estoma hacia un dispositivo de drenaje Sácalo, una bolsa. tubo ileal La orina ya no se almacena en el cuerpo. Fluirá continuamente en la bolsa de aplicación. a la piel la bolsa se vaciará varias veces al día.

Tener un alto riesgo no necesariamente implica que alguien vaya a desarrollar el cáncer. Algunas veces, el cáncer puede desarrollarse sin ninguna causa aparente.

Es importante mantener un estilo de vida saludable. Si usted fuma, intente dejarlo. Siga las medidas de prevención en su puesto de trabajo y evite la exposición a agentes químicos nocivos.

Algunas evidencias indican que beber muchos líquidos, principalmente agua, pueden disminuir los riesgos de padecer cáncer de vejiga. Tener una dieta equilibrada rica en fruta y verduras tiene beneficios saludables y puede proteger contra el cáncer. Si usted tiene dudas o necesita consejo para mantener un estilo de vida saludable consulte con su médico de referencia.



ADENOMA O CANCER DE PROSTATA

El cáncer de próstata se desarrolla en las células de la glándula prostática. muchos cánceres Próstata de crecimiento lento que es poco probable que se propague, pero algunos pueden De crecimiento más rápido, se desconoce la causa exacta del cáncer de próstata y, en su En las primeras etapas, generalmente no hay síntomas. El cáncer de próstata temprano generalmente no presenta síntomas. síntoma Puede ocurrir a medida que el cáncer progresa, por ejemplo, con mayor frecuencia La forma en que orina y la micción difícil o urgente, generalmente causada por La presión que el cáncer ejerce sobre la uretra. Diagnóstico de cáncer de próstata Por lo general, se basa en los resultados de un examen clínico y pruebas de la próstata. análisis de sangre para verificar los niveles de una proteína llamada antígeno prostático (PSA) y resultados de la biopsia.

Para que los pacientes con cáncer de próstata reciban las mejores opciones de tratamiento en cada etapa de su enfermedad y puedan acceder a los nuevos avances e innovaciones generados por la investigación de ensayos clínicos, el tratamiento del cáncer de próstata debe comenzar en la etapa inicial. Un equipo multidisciplinario, que debe involucrar a tres especialistas clave que deben estar disponibles para el paciente durante su enfermedad:

- urólogo
- Oncólogo Médico
- oncólogo radioterápico



FUENTES BIBLIOGRAFICAS

UDS ANTOLOGIA. (2023f). UDS PLATAFORMA EDUCATIVA. Recuperado 8 de junio de 2023, de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/c5eb7bdaa7a7049e4>

[25d41efbcf75b30-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf](https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/c5eb7bdaa7a7049e4/25d41efbcf75b30-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf)