



**Nombre de alumno: Edson Daniel de Leon Dominguez.**

**Nombre del profesor: Maria Cecilia zamorano Rodríguez**

**Nombre del trabajo: resumen**

**Materia: practica clinica de enfefmeria**

**Grado: 6to Cuatrimestre**

**Grupo: B**

Lavado de Mano Social

1. Concepto
2. 3 objetivos
3. Materiales y equipo
4. Procedimiento

ACT. 1

1. Es el procedimiento que se realiza desde casa antes de comer o de ingerir algún alimento y tratar de no contaminarnos
2. Mantener las manos limpias, ayudar a evitar infecciones y microorganismos
3. Agua y Jabón, toalla
4. Lavarse primero las palmas, el dedo, las uñas y enjuagarse

Cinco momentos del lavado de manos

1. Concepto
2. 3 objetivos
3. Materiales y equipo
4. Procedimiento

ACT. 2

1. Procedimiento que se realiza antes de tocar al paciente o material para evitar infecciones o contaminar.
2. Evitar contraer infecciones nosocomiales, mantener las manos limpias y mata bacterias

- 3. Agua, gel, clorhidina y toalla
- 4. Primero se enjuaga las manos, se le echa jabon - se lava los dedos, puñeros, interdigitales y luego se enjuaga.

### Lavado de manos clinico

- 1. Concepto
- 2. 3 objetivos
- 3. Material y equipo
- 4. Procedimiento

ACT 3

- 1. Es el procedimiento en el cual se realiza el lavado de manos clinicos para evitar no contaminar
- 2. Evitar contrair infecciones - prevenir patologias

- 3. Agua, Jabon, toalla
- 4. Se enjuaga la mano con agua, se le echa jabon, se lavan los puñeros de las manos, interdigitales, lavado de dorso y viceversa, friccion de dedos, lavado de uñas, puñeros y oclonar las muñecas y se enjuaga

# ACT 4 Lavado de manos Quirúrgico

- 1.- concepto
- 2.- 3 objetivos
- 3.- Material y equipo
- 4.- Procedimiento

- 1.- Es un procedimiento que se realiza antes y después de estar en contacto con paciente
- 2.- Disminuir la cantidad de bacterias, suciedad y materia orgánica
- 3.- Jabón líquido, cepillo de uñas desechable, toalla
- 4.- Mojarse las manos con agua - colaborearse los manos - frotarse las manos con el jabón hasta que haya espuma después atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas, restregarse las manos durante al menos 20 segundos.

# ACT 5 MASTECTOMIA

Es la extirpación de ambos senos, también denominada mastectomía doble. se lleva a cabo como cirugía de reducción de riesgo en las mujeres con un riesgo muy alto de padecer cáncer de seno.

Si hay cáncer en ambas mamas, o si tiene un riesgo alto de desarrollar un segundo cáncer de mama debido a antecedentes familiares marcados por éste o una mutación genética heredada.

## TRANSPLANTE RENAL

IRC

Es una cirugía para colocar un riñón sano en una persona con insuficiencia renal.

Se recibe un riñón donado realizado para reemplazar el trabajo parcialmente realizado.

### SINTOMAS

- Mal estado
- Náuseas
- Cefalea
- Emesis
- Injuria

### TRATAMIENTO

- Medicamentos
- Diálisis
- Hemodiálisis
- Trasplante renal

### EPIDEMIOLOGIA

Afecta aproximadamente al 10% de la población adulta en diferentes partes del mundo.

(CENTRA) 12.7% pacientes se encuentran en la lista de espera para trasplante renal.

El 30% de pacientes que el donante potencial es incompatible con su receptor.

## TRASPLANTE DE CORAZON HETEROTOPICO

Es un procedimiento médico especializado que implica transferir un órgano o tejido sin remover el órgano original como por ejemplo en el cuerpo del receptor.

### VENTAJAS

Puede ser beneficioso en ciertas circunstancias, por ejemplo, puede ser útil cuando el órgano original tiene alguna función residual que podría mejorarse con el fígado, o cuando se espera que el órgano transferido funcione solo por un periodo de tiempo limitado.

### DESVENTAJAS

Aunque el trasplante heterotópico puede ofrecer ventajas también presenta desafíos.

El hecho de que el órgano transferido se coloque en una ubicación anatómica diferente puede complicar la cirugía y el postoperatorio.

### RECOMENDACION

Los pacientes <sup>que</sup> se someten a un trasplante heterotópico requieren un seguimiento cuidadoso y un régimen de medicamentos inmunosupresores para prevenir el rechazo del órgano transplantado.

ACT 8

ACT 9

EXPOSICIÓN

## REDUCCIÓN ABIERTA Y FIJACIÓN INTERNA EN FRACTURA DE HUMERO

Se utiliza para estabilizar y consolidar un hueso roto

### RIESGOS

- Perforación del tornillo de la cabeza del humero
- Tornillo o placas rotos
- Infección
- Sangrado
- Daño a los nervios

### SIGNOS

El hombro y el brazo son dolorosos y se infla más. Dificultad para levantar el brazo

### DIAGNOSTICO

- Radiografías simples
- A veces TC

### CUIDADOS

- Observar si hay enrojecimiento y pérdida de la integridad de la piel
- Vigilar el color de la piel y comprobar la temperatura de la piel
- Inspeccionar la herida cada vez que se requiera un cambio de vendaje. Evitar presionar la herida.