



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Edson Daniel de León Domínguez

Docente: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Parcial: 3°

Nombre de la Materia: Práctica clínica

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6°

/ /

Instalación de catéter venoso periférico

- Venoclisis** { Administración de fármacos diluidos por vía endovenosa mediante un sistema de aporte continuo
- Infusión intermitente.** { El medicamento se administra de forma diluida en pequeñas cantidades de solución fisiológica o dextrosa, transfundido de entre 30 minutos o más (según el medicamento).
- Infusión continua** { Se administrará por más de 12 horas, el volumen de dilución dependerá del medicamento.
- Bolo endovenoso** { Dosis altas, vía endovenosa, entre 1 y 30 minutos.
- Materiales** {
 - Riñonera
 - Campo estéril
 - Jeringas 5ml
 - Suero fisiológico
 - Ligadura
 - Llave de triple vía
 - Guantes estériles
 - Alcohol medicinal
 - Tergadem
 - Catéter venos perif.
- Procedimiento** {
 1. Lavado clínico de manos
 2. Colocarse guantes clínicos.
 3. Elegir vena
 5. Ligar el brazo elegido
 6. Insertar la aguja en la vena a 30° o 40°
 7. Progresar unos milímetros
 9. Conectar la llave de 3 vías
 10. Fijar el bocanillo con tergadem
 11. Administrar tratamiento médico
 4. Liberar sitio de punción
 8. Soltar ligadura

Scribe