



**Nombre del alumno: Mario Alberto Velazco  
vazquez**

**Nombre del profesor: Maria Cecilia zamorano**

**Grado: "6"**

**Grupo: "B"**

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas marzo de 2023

## Tipos de enfermedad causadas por alteraciones en la piel.

**Introducción:** La piel es un órgano desarrollado sencillamente en el adulto mayor y los niños, la piel se compone de tres capas: epidermis, dermis e hipodermis.

**Desarrollo:** La piel presenta las siguientes funciones, protectora, sensorial y termorreguladora. La patología más conocida es:

Una de las principales alteraciones es la dermatitis, es una enfermedad inflamatoria común de la piel su prevalencia es mayor en niños que en adultos, se sabe que tiene una etiología hereditaria, la presencia clínica varía con la edad, por lo que se observan tres etapas las cuales son: lactancia, infancia, adolescencia o adultez.

Ninguna fase es obligatoria por lo que la enfermedad puede pasar, remitir o curar.

Las lesiones cutáneas se pueden clasificar según la etapa evolutiva de la misma en:

**Agudas:** lesiones inoportunamente episódicas con papulas sobre la piel eritematosa.

**Subagudas:** papulas asimptomas descamativas y eritematosas.

**Crónicas:** hiperqueratosis con engrosamiento de la piel.

### > Dermatitis de contacto

Es una reacción localizada de la piel causada por contacto con una sustancia que es -alérgica ajena al cuerpo.

Las sustancias que causan dermatitis de contacto suelen ser: Cosméticos, Productos de limpieza, Crema de manos, cosméticos, Productos químicos industriales, Aditivos de la luz electera.

Entre los síntomas más comunes:

- Enrojecimiento e inflamación de la zona afectada
- Prurito
- Generación de calor en la zona
- Excepción o lesión cutánea en dicha zona (Pueden surgir erupción, ampollas o vesículas).

### > Dermatitis por estasis

También llamada dermatitis gravitacional ocurre en la zona de las piernas debido a la estasis o mala circulación de retorno.

### > Dermatitis seborreica

Es un trastorno común en la piel que afecta sobre todo al cuero cabelludo provocando caspa.

### > Dermatitis seborreica

De la zona costal lactea.

Puede afectar zonas de la cara, la espalda o parte superior del pecho.