



Nombre del Alumno: Hernández Velasco Georgina del Rosario

Nombre del tema: Cuadro Sinóptico

Parcial: I

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: VI

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

SINTOMAS ERGE

- > Acidez y/o la regurgitación
- > ^{ácida} RA. se da cuando los flujos gástricos ascenden, pudiendo llegar hasta la boca.

S. MENOS COMUNES

- > Dolor de pecho.
- > Dolor de garganta.
- > Dificultad respiratoria.
- > Jaquecos.
- > Tos.
- > Asma.

El cáncer de esófago se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia fuera (a través de la submucosa y la capa muscular).

1.5.1. ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO

2 PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER DE ESÓFAGO:

CÁNCER DE CÉLULAS ESCUADROSAS


Este tipo de cáncer puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del esófago, pero es más común en la porción del esófago de la región del cuello y en los dos tercios superiores de cavidad torácica.

ADENOCARCINOMA

Los cánceres que se originan de células glandulares (células que producen mucosidad) se denominan adenocarcinomas.

Este tipo de cáncer ocurre generalmente

1.5.1.2. CÁNCER DE ESÓFAGO



1.5.2 Los enfermedades de los víscas mencionados surgen a causa de anomalías en el interior o exterior de los intestinos y pueden derivar desde los que producen síntomas leve y los que causan manifestaciones intratables.

1.5.2.1 GASTRITIS

GASTRITIS
AGUDA

GASTRITIS
CRÓNICA

ULCERA
GÁSTRICA

1.5.2.1 CÁNCER DE ESTÓMAGO

SINTOMAS

Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo puede ser aguda o crónica.

Tiende a estar provocado por infecciones víricas bacterianas o parasitarias.

Es causada por determinados infecciones como continuado y excesivo alcoholismo, tabaco y posteriormente por la anemia perniciosa.

Es conocida como úlcera péptica, causa dolorosamente dolor apremiante o retortivo con frecuencia de aparición nocturna y se alivia de manera rápida con la ingestión de alimentos o antiácidos.

Aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células de cualquier parte del estómago y puede ser benigna o maligna.

Molestias abdominales en la zona del estómago.
Vómitos.
Puede surgir náuseas.
Pérdida de peso.

BIBLIOGRAFIA

[PATOLOGIA DEL ADULTO LIBRO 604.pdf](#)