



**Nombre de alumno:** Brallan López Solorzano

**Nombre del profesor:** Maria del Carmen Lopez Silba

**Nombre del trabajo:** Cuadro Sinoptico

**Materia:** Patología del Adulto

**Grado:** 6

**Grupo:** B

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de enero del 2023

# Patologías digestivas

**PROBLEMAS ESOFÁGICOS:  
ENFERMEDAD POR  
REFLUJO  
GASTROESOFÁGICO.  
CÁNCER DE ESÓFAGO.**

Los síntomas más característicos del ERGE son los siguientes:

*Acidez y/o la regurgitación ácida: La acidez es una sensación de ardor, también conocida como pirosis, que se siente detrás del esternón, y aparece cuando el contenido gástrico pasa al esófago produciendo una irritación de la mucosa.*

*La regurgitación ácida en el pecho se da cuanto los fluidos gástricos ascienden, pudiendo llegar hasta la boca, Otros síntomas, los cuales son menos comunes, pueden estar relacionados con esta patología como; dolor de pecho, jadeos, dolor de garganta.*

**PROBLEMAS GÁSTRICOS:  
GASTRITIS. ÚLCERA GÁSTRICA.  
CÁNCER DE ESTÓMAGO.**

**GASTRITIS Y ÚLCERA GÁSTRICA GASTRITIS:**

*Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago, y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo (lo que depende de su causa y del tratamiento médico prescrito) puede presentarse de manera aguda o crónica.*

★ *El cáncer de estómago aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago y puede ser benigna o maligna, si se trata de afección maligna el 90% de los casos se deben al adenocarcinoma gástrico.*

★ *Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.*

*Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.*

★ **ÚLCERA PEPTICA:** *Es una llaga situada en la pared interna del estómago o del intestino delgado superior (duodeno).*

★ **GASTROENTERITIS:** *Inflamación (irritación) de la mucosa del estómago y del intestino. La pérdida de apetito y las náuseas, seguidas de diarrea, son los primeros síntomas de esta enfermedad.*

★ **GASTRITIS:** *Inflamación del revestimiento del estómago, que se presenta con sensación de ardor o dolor en la boca del estómago.*

# Patologías digestivas

**PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL. COLITIS ULCEROSA. CÁNCER DE COLON. OSTOMIAS.**

- ★ **CÁNCER DE COLON:** Se desarrollan a partir de adenomas de colon previos, y el cáncer colorrectal se puede evitar detectando y reseando los pólipos adenomatosos del colon. La detección de pólipos y de cánceres precoces asintomáticos se puede realizar analizando la presencia de sangre oculta en heces y por el examen directo de la mucosa.
- ★ **COLITIS ULCEROSA:** Los pacientes con UC de larga evolución tienen mayor riesgo de presentar displasia epitelial del colon y carcinoma.
- ★ **OSTOMIAS:** Es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

**PROBLEMAS DE RECTO Y ANO: HEMORROIDES. FISURA ANAL. FISTULAS ANALES.**

**INCIDENCIA Y ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:** Las hemorroides sintomáticas afectan en el mundo occidental cada año a más de un millón de personas. La prevalencia de dicho trastorno no muestra preferencia por edades ni sexos. Sin embargo, se sabe que el envejecimiento tiene un efecto nocivo para el conducto anal.

Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas, las hemorroides pueden desarrollarse dentro del recto (hemorroides internas) o debajo de la piel alrededor del ano (hemorroides externas).

**PROBLEMAS ABDOMINALES: ENFERMEDAD DIVERTICULAR. APENDICITIS AGUDA. HERNIAS.**

- ★ **HERNIAS:** Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo). El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el musculo, denominada fascia. El tipo de hernia depende de la ubicación.
- ★ **LA DIVERTICULOSIS DEL COLON:** es un problema común que afecta a personas de 60 años de edad y a casi todos de 80 años, solo un pequeño porcentaje de las personas con diverticulosis tienen síntomas y un número a un menor necesita cirugía.
- ★ **APENDICITIS AGUDA:** La incidencia máxima de la apendicitis aguda se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, es relativamente rara en los dos extremos de la vida. Afecta por igual a ambos sexos, salvo entre la pubertad y los 25 años.

