



**Nombre de alumno: Celina Guadalupe
Aguilar Zamorano**

**Nombre del profesor: María del Carmen
López Silba**



Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Enfermería del adulto

Grado: 6

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a **7 de**
julio de 2023.



Traumatismo
craneoencefálico:

Disfuncion cerebral
ocasionada por un impacto
externo, generalmente un
golpe en la cabeza



3/6/23
7/6/23

Tarea/Plataforma

Enfermería del adulto

CONTUSIONES: Son simples golpes, más o menos profundos. Las contusiones se manifiestan en forma de Equimosis o de hematoma.

FRACTURA DE LA BASE DEL CRÁNEO

Es la rotura de un hueso de la cabeza. Puede ir

acompañada de lesión cerebral o no. Los síntomas consisten en dolor, pérdida de líquido por la nariz o los oídos.

Las fracturas craneales producen lesiones en las arterias y las venas, que sangran en los espacios cercanos al tejido cerebral.


La fractura de cráneo ocurre a menudo sin lesión cerebral.

Las fracturas, en especial las que se producen en la parte posterior y en el (base) del cráneo, pueden desgarrar las meninges, las capas de tejido que recubren el encéfalo. A veces estas fracturas facilitan el paso de bacterias al cráneo, lo que ocasiona infecciones y lesiones cerebrales graves. A veces, algunos fragmentos de la caja ósea del cráneo presionan hacia abajo y dañan el cerebro. Este tipo de fracturas se denominan fracturas por hundimiento.

Fracturas Craneales por hundimiento

Provocando infección o formación de absceso (absceso purulento) en el interior del cerebro.

Exponen al Cerebro a la acción del medio y de materiales extraños




SINTOMAS

✓ El líquido cefalorraquídeo, el líquido transparente que circula por la superficie del encéfalo entre las meninges, sale por la nariz (rinorrea) o por los oídos (otorrea)

✓ La sangre se acumula detrás del tímpano o, si el tímpano está roto, fluye por el oído

✓ Se forma un hematoma detrás de la oreja (signo de Battle) o alrededor de los ojos (ojos de mapache :-)

✓ La sangre puede acumularse en los senos paranasales, que también pueden fracturarse.




Otoliquia
Signo
Battle

Rinoliquia

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Se diagnostican habitualmente en personas con traumatismo craneal cuando se les está realizando una T.C. La T.C es mejor que la resonancia magnética nuclear (RMN).

Las personas que desarrollan convulsiones requieren anticonvulsivos. Con excepción de las fracturas de la base del cráneo y las fracturas deprimidas, la mayoría de las fracturas de cráneo no requieren tratamiento específico.



ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Es importante contar con planes en los que se definen acciones específicas, acondicionando áreas críticas, disponibilidad de recursos, estrategias de operación y comunicación al interior de la unidad y al exterior de las instalaciones.

MISIÓN: desarrollar acciones de atención médica bien organizada, integral y oportuna, eficiente y eficaz a la

población demandante afectada por fenómenos destructivos de origen natural o antrópico.

VISION: Ser el establecimiento de salud modelo que ante la presencia de fenómenos destructivos o epidemiológicos de gran magnitud, garantiza la calidad y continuidad de la prestación de los servicios, asegurando servicios accesibles.

OBJETIVO: Contar con un instrumento operativo para el hospital ante emergencias y desastres, cuya estructura facilite el funcionamiento oportuno y eficiente ante situaciones de crisis de diversa etiología.

BIBLIOGRAFÍA

- (UDS, RECUPERADO EL...
ENFERMERÍA DEL ADULTO)