



CUADRO SINOPTICO

Nombre del alumno: Jesus Eduardo Gordillo Martínez

Materia: Enfermeria del adulto

Docente: María del Carmen lopez silba

LEN

6: B

"Fractura De La Base Del Craneo"

Las fracturas de la base del craneo suelen darse en contexto de traumatismo craneo-encefalico severo, y son una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. Suelen acompañar a otras fracturas craneales y pueden asociarse a lesiones cerebrales.

Signos y lesiones asociados a fracturas de base de craneo

- * Hay diversos hallazgos directos que deben hacernos buscar una fractura de base de craneo, como por ejemplo la presencia de hemotoma o neuroencefalito.
 - o Equimosis ("ojos de morcote")
 - o Rinorrea (fracturas de la elaca cribriforme)
 - o Anisocoria (Lesión del I For craneal)
 - o Lesión orbitaria o pérdida de la visión.
 - o Hematoma retroauricular (signo de Battle)
 - o Otorragia
 - o Lesión vascular (Infartos cerebrales)

Complicaciones

- ← Fístulas LCR
- Fracturas del foramen ciego
- Lesiones hemorrágicas intracraniales
- Lesión de vasos craneales
- Lesión vascular
- Items a reusar