



**Nombre de alumno: Mari Bella Pascual
Juan**

**Nombre del profesor: María del Carmen
López Silba.**

Nombre del trabajo: Ensayos.

PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre de la materia: Enfermería del
adulto.**

Grado: 6

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Julio del 2023.

Martes

04-jul-23.

FRACTURA DE LA BASE DEL CRÁNEO.

Una fractura de cráneo es la rotura de un hueso de la cabeza. La fractura craneal puede ir acompañada de lesión cerebral o no.

Los síntomas consisten en dolor, síntomas de traumatismo craneal, y, en ciertas fracturas, pérdida de líquido por la nariz o los oídos o hematomas detrás de las orejas o alrededor de los oídos. Las fracturas, en especial las que se producen en la parte posterior y en el fondo (base) del cráneo, puede desgarrar las meninges, las capas de tejido que recubren el encéfalo. A veces estas fracturas facilitan el paso de bacterias al cráneo, lo que ocasiona infecciones y lesiones cerebrales graves. A veces, algunos fragmentos de la caja ósea del cráneo presionan hacia abajo y dañan el cerebro.

FRACTURAS DE CRÁNEO CON HUNDIMIENTO.

En este tipo de fractura, uno o más fragmentos de hueso ejercen presión hacia el interior del cerebro y lo lesionan. Además, el cerebro queda expuesto al exterior. La infección y la formación de abscesos que intentan evitar retrayendo los materiales extraños y el tejido muerto y reparando la lesión en la medida de lo posible. Los fragmentos del cráneo se levantan, se colocan de nuevo en su sitio y se sutura la herida.

FRACTURA DE CRÁNEO EN NIÑOS.

En los bebés que tienen fractura de cráneo, las membranas que rodean el cerebro sobresalen en algún caso a través de una fractura y quedan atrapadas por los bordes de esta, formando un saco lleno de líquido llamado fractura de crecimiento o quiste leptomeningeo.

El saco se desarrolla durante 3 a 6 semanas y es la primera evidencia de que el cráneo estaba fracturado.

SÍNTOMAS.

Ciertos síntomas sugieren una fractura en la base del cráneo.

→ El líquido cefalorraquídeo, el líquido transparente que circula por la superficie del encéfalo entre las meninges, sale por la nariz (rinorrea) o por los oídos (otorrea).

→ La sangre se acumula detrás del tímpano o, si el tímpano está roto, fluye por el oído.

→ Se forma un hematoma detrás de la oreja (signo de batalla o signo de battle) o alrededor de los ojos (ojos de mapache).

DIAGNÓSTICO.

Las fracturas craneales se diagnostican habitualmente en personas con traumatismo craneal cuando se le está realizando.

→ Tomografía Computarizada (TC).

→ Resonancia Magnética (RMN).

Se realizan para diagnosticar una lesión cerebral. Por lo general, las pruebas no son necesarias para diagnosticar fracturas.

TRATAMIENTO.

La mayoría de las personas con fracturas craneales sin lesión cerebral son ingresadas en el hospital para su observación. Las personas que desarrollan convulsiones requieren anticonvulsivos. Con excepción de las fracturas de la base del cráneo y las fracturas deprimidas, la mayoría de las fracturas de cráneo no requieren tratamiento específico.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA.

Ante esta responsabilidad, es fundamental contar con la capacidad operativa durante y después de una contingencia o desastre lo que implica la organización técnica y administrativa de todo el personal directivo y de las diferentes disciplinas y áreas, para que exista la disposición y colaboración para contribuir a mejorar la efectividad y eficiencia de la atención en lesionados.

Para ello, es importante contar con planes en los que se definan acciones específicas, acondicionamiento de áreas críticas, disponibilidad de recursos, estrategias de operación y comunicación al interior de la unidad y al exterior de las instalaciones como parte del sistema de servicios de salud.

CUIDADOS DE ENFERMERIA.

→ Alivio del dolor: administrar medicación, paños calientes.

→ Cambios en la dieta: lácteos, dieta equilibrada.

→ Hábitos higiénicos: SI.

→ Ejercicios: Con soporte de peso (es esencial) caminar, golf, natación (excelente rehabilitación de columna).

- Disminuir la posibilidad de traumatismos: zapatos blandos, plantillas acolchadas.
- Información: Cerciorarnos que hemos sido entendidos.