Nombre de alumno: FILADELFO DOMINGO RUÍZ HERNÁNDEZ

Nombre del profesor: GONSALO RODRIGUEZ

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL

Materia: ZOOCTENIA DE PUERCOS

Grado: 6

Grupo: LMVZ

Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de diciembre de 2021

Instalaciones para porcino

Factores a considerar en la construcción de las instalaciones

factores a considerar

los costos no deben ser más del 10 al 15% con relación a todos los costos

depende de

de cada localidad y a cada tipo de explotación, es así como en climas cálidos

materiales a utilizar

deben ser de fácil consecución y procurar que sean de la región y de bajo costo pero que, al mismo tiempo, ofrezcan larga duración y resistencia

ESPACIO REQUERIDO POR CERDO

ETAPAS DEL DESARROLLO	ESPACIO (m2)
Hasta 15 Kg.	0.33
De 15 a 45 Kg.	0.45 a 0.50
De 45 a 70 Kg.	0.65 a 0.75
Más de 70 Kg.	0.86 a 1.20
Reproductor	1.2 a 2.2
Gestación	1.6 a 2.1

Materiales para las instalaciones

los

materiales de construcción deben ser duraderos, económicos y que permitan fácil limpieza y desinfección.

Pisos:

con un espesor de 10 cm., declive o inclinación del 3 al 5% para facilitar la limpieza y el drenaje de las cocheras

Paredes y muros:

se utiliza materialsólido y continuo como concreto, ladrillo revestido de cemento, bloques de concreto

Pasillos

deben ser amplios y cómodos ya que por estos transitaran los operarios de lagranja

Techos y cobertizos:

en el uso tenemos teja de barro, aluminio, zinc, teja de cartón impermeable, palma o paja, madera

Instalaciones de gestación.

Área de Maternidades

compuesta por un conjunto de salas de capacidad variable (entre 6 y más de 20 jaulas)

Instalaciones de Destete/Transición

permanecer en destete/transición desde que se separan de la madre hasta aproximadamente los dos meses o dos meses y medio de vida

Instalaciones para crecimiento y engorde

suele realizarse en naves grandes capaces de albergar entre varios cientos y más de mil cerdos

Instalaciones para reproducción

La verraquera se debe ubicar en el centro de los corrales donde se ubican las cerdas de cría, esto con el objetivo de estimular e intensificar las manifestaciones del celo de las cerdas.