



**Mi Universidad**

**Super nota**

*Nombre del alumno* Daniela Yamile Domínguez Pérez

*Nombre del tema* Porcinos

*Parcial* 3

*Nombre de la materia* Zootecnia de porcinos

*Nombre del profesor* Gonzalo Rodriguez Rodriguez

*Nombre de la Licenciatura* MVZ

*Cuatrimestre* 6

# Porcinos

## Manejo en la reproducción

Para dar cría a la hembra debe ser cubierta (servida). Para hacer copula con el macho en la época de celo, se reconoce cuando esta inquieta, busca el macho, se retuerce, pierde el apetito y presenta hinchada y enrojecida la vulva, cuando esta en este estado debe llevarse al puesto de monta y dejarlos tranquilos, para asegurar la fecundación pasadas 10 horas del acoplamiento, debe volverse a llevar a la hembra a la celda del reproductor.



## Manejo de la gestación

La gestación de la cerda tiene una duración aproximada de tres meses, tres semanas, tres días. Es importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos. Las hembras deben disponer en todo momento de agua limpia y fresca para consumo a voluntad y la práctica más adecuada para manejar cerdas en gestación es el uso de comederos individuales.



## Descolmillado

Los lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior. Estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda, esta se puede negar a amamantar si ha sufrido lesiones de este tipo. Además de dañar la cara de otros lechones.



## Sacrificio

Los animales necesitan tranquilizarse y minimizar el estrés sufrido durante el transporte, ya que, si los animales se sacrifican sin dejarles descansar, la calidad de la carne es peor y el sangrado se efectúa con más dificultad.



## Muerte neonatal

La mortalidad neonatal de lechones es un problema económico y de bienestar animal importante. El porcentaje de mortalidad neonatal varía mucho entre granjas, oscilando entre el 5 y el 35%. Las muertes ocurren principalmente durante las primeras 48 horas después del parto.

Causas comunes:

- Aplastamiento
- Desnutrición
- Hipotermia
- Enfermedades

