



Parcial 3

Nombre de la materia: Zoonosis en Porcinos

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: **MVZ**

Cuatrimestre 6

PORCINOS


MAMANEJO EN LA REPRODUCCIÓN

Al dar cría a la hembra debe ser cubierta (servida). Para hacer copula con el macho en la época de celo, se reconoce cuando esta inquieta, busca el macho, se retuerce, pierde el apetito y presenta hinchada y enrojecida la vulva, cuando esta en este estado debe llevarse al puesto de monta y dejarlos tranquilos



MANEJO DE LA GESTACIÓN

La gestación de la cerda tiene una duración aproximada de tres meses, tres semanas, tres días. Es importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos.



DESCOLMILLADO

Los lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior. Estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda, esta se puede negar a amamantar si ha sufrido lesiones de este tipo.



SACRIFICIO

El sacrificio del porcino se realiza por desangrado en el pecho. La sección de las arterias y venas del tronco braquiocefálico interrumpe el aporte de nutrientes y oxígeno al cerebro, provocando la muerte del animal. Dicha muerte no es inmediata sino que requiere un periodo de hasta 24 s.



MUERTE NEONATAL

El porcentaje de mortalidad neonatal varía mucho entre granjas, oscilando entre el 5 y el 35%. Las muertes ocurren principalmente durante las primeras 48 horas después del parto.

Causas comunes:

- Aplastamiento
- Desnutrición
- Hipotermia
- Enfermedades

