



Nombre del alumno: Andrik Edelvani
Villatoro Ayala

Nombre del profesor: Gonzalo Rodriguez

Materia: Zootecnia de porcinos

Nombre del trabajo: Supernota

Grado: 6 cuatrimestre

Carrera: Medicina veterinaria y zootecnia

Grupo: A

Lugar y fecha: Comitán D e Dominguez
CHIapas, 7 de julio de 2023

MANEJO DE LOS CERDOS

1. Manejo en la reproducción

Prácticas de reproducción:

- Para dar cría a la hembra debe ser cubierta
- Para hacer cópula con el macho en la época de celo, se reconoce cuando está inquieta, busca al macho, se retuerce, pierde el apetito y presenta hinchada y enrojecida la vulva
- Cuando está en este estado debe llevarse al puesto de monta y dejarlos tranquilos, la unión es en un buen número de minutos debida a la lenta eyaculación del semen
- Para asegurar la fecundación pasadas 10 horas del acoplamiento debe volverse a llevar a la hembra a la celda del reproductor



Manejo en la gestación

- Generalmente se mantiene a la cerda estabulada en corrales con piso de concreto o jaulas alternando con potreros con buen pasto
- Es importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos
- Las cerdas deben disponer en todo momento de agua limpia y fresca para consumo a voluntad
- La práctica más adecuada para manejar cerdas en gestación es el uso de comederos individuales
- La cerda tarda 3 días para acostumbrarse a los comederos



Descolmillado

- Los lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior
- El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento, hasta que ingiera calostro
- Procedimiento: Lavar el corta colmillos
- Sostener al lechón con el dedo mayor colocado en el ángulo de la mandíbula y el dedo anular a través de la tráquea para suprimir los chillidos
- Colocar el corta colmillos en posición paralela al hueso de la mandíbula. No colocar el corta colmillos en las encías



Muerte neonatal

- La mortalidad neonatal de lechones es un problema económico
- El porcentaje de mortalidad neonatal oscila entre el 5 y 35%
- Las muertes ocurren dentro de las primeras 48 horas
- La mortalidad neonatal de lechones es el resultado de un conjunto entre cerda lechón y ambiente

Sacrificio

- Una vez realizada la descarga de animales, los animales necesitan tranquilizarse y minimizar el estrés sufrido durante el transporte
- Pasos previos:
- Antes del sacrificio los cerdos se trasladan por su propio pie a través de los pasillos
- Un paso previo al aturdimiento es el ducheo de los animales con agua fría a una temperatura de 12°C
- Al estar fría el agua la sangre periférica se concentra en los grandes vasos con lo que se consigue una sangría más completa
-

