



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**PSICOPATOLOGIA**



**DOCENTE: LUIS ANGEL FLORES  
HERRERA**



**LICENCIATURA: LICENCIADA EN PSICOLOGIA GENERAL**



**6° "A"**

**ALUMNA: ERIKA DE JESUS MORALES AGUILAR**

**UNIDAD: IV**




**23 DE JULIO DEL 2023**





## TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

persona asustada o ansiosa  
ante la separación de  
aquellas personas por las que  
siente un apego.



## CRITERIOS DE DIAGNOSTICO

pesadillas repetidas sobre el  
tema de separación.  
miedo o ansiedad excesiva e  
inapropiada.



## PREVALENCIA

Niños.  
Adolescentes menores de  
18 años.  
Adultos.



## DURACIÓN

Niños y adolescentes  
(al menos 4  
semanas).  
Adultos  
(normalmente dura 6  
meses o mas).



## FACTORES DE RIESGO

Ambientales: se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital de una pérdida.



## FOBIA ESPECIFICA

Presentan miedo hacia situaciones u objetos precisos.



## DURACIÓN

Dura típicamente seis o más meses.



## GENETICOS Y FISIOLÓGICOS

Se da en los niños que pueden ser hereditario.



## CRITERIO DE DIAGNOSTICO

Miedo o ansiedad (volar, alturas, animales).  
Se expresa con llanto, quedarse paralizados.



## PREVALENCIA

5 % en los niños.  
16 % de 13 a 17 años de edad.  
Las mujeres se ven más afectadas que los varones.



## FACTORES DE RIESGO

Temperamentales: afectividad negativa (neuroticismo) o la inhibición conductual.



## GENETICOS Y FISIOLÓGICOS

puede haber una susceptibilidad genética a una determinada categoría de fobia específica.

## AMBIENTALES

sobreprotección de los padres, la pérdida de los padres, separación, el maltrato físico y abuso sexuales.



# FUENTE BIBLIOGRÁFICA

DSM5.pdf

