



# Mi Universidad

*Nombre de la Alumna: Erika De Jesús Morales Aguilar*

*Nombre del tema: Trastornos Relacionados Con Traumas Y Factores De Estrés*

*Unidad: III*

*Nombre de la Materia: psicopatología*

*Nombre del profesor: Luis Ángel Flores Herrera*

*Nombre de la Licenciatura: Psicología General*

*Cuatrimestre: 6°*

**TRASTORNOS  
RELACIONADOS  
CON TRAUMAS Y  
FACTORES DE  
ESTRÉS**

**TRASTORNO  
OBSESIVO  
COMPULSIVO**

Son pensamientos,  
impulsos o imágenes  
mentales.  
Duración: entre 6 y 2 años.

Factores: Escenas  
violentas, apuñalar a  
alguien y dolores de  
cabeza, etc.

Prevalencia: En la  
adolescencia o  
cuando se es  
adulto joven.

**TRASTORNO  
DISMORFICO  
CORPORAL**

Le causa malestar en lo  
social y laboral.  
Preocupados en su  
aparición física.

Duración: Antes de los 18  
años. Prevalencia: En la  
adolescencia en general  
las mujeres.

Factores: Se ha asociado  
con tasas de altas de  
abandono y abuso durante  
la infancia.

**TRASTORNO DE  
ACUMULACION**

Objetos de acumulación,  
el temor a perder  
información,  
organización y sistema.

Duración: sin especificado.  
Prevalencia: Afecta a  
varones como mujeres.  
Mayor en los varones.

Factores:  
Temperamentales.  
Ambientales.  
Genéticos y  
fisiológicos.

**TRICOTILOMANIA**

Arrancarse el pelo de  
forma recurrente.  
Deterioro social y  
laboral.

Prevalencia:  
Afectadas con más  
frecuencia  
mujeres.

Duración: Aparecen y  
desaparecen durante semanas,  
meses o años.  
Factores: genéticos y fisiológicos.

**T.O.C.  
RELACIONADO A  
OTRA AFECION  
MEDICA.**

Preocupaciones por el  
aspecto, acumulación,  
rascarse la piel,  
arrancarse el pelo.

Prevalencia:  
Invariabilidad del  
paciente.

Factores: Antecedentes  
familiares.  
Duración: Sin  
especificado.

**TRASTORNO DE  
EXCORIACION  
(RASCARSE LA  
PIEL)**

Dañarse la piel de  
forma recurrente  
hasta producirse  
lesiones cutáneas.

Prevalencia: En  
adultos, las tres  
cuartas en mujeres.

Factores: genéticos y  
fisiológicos.  
Duración:

**T.O.C. DEBIDO AL  
CONSUMO DE  
SUSTANCIA/MEDI-  
CAMENTO**

Obsesiones  
compulsiones,  
rascarse la piel,  
antecedentes del uso  
de sustancia.

Duración:  
aproximadamente un mes.  
Prevalencia:  
invariabilidad del  
paciente.

Factores:  
ambientales

**TRASTORNO DE  
APEGO REACTIVO**

El niño raramente  
busca consuelo  
cuando siente  
malestar.

prevalencia: Se ha  
observado en los niños  
pequeños, aparece en  
menos del 10% de  
niños.

Factores:  
Ambientales.  
Duración: entre los 9  
meses y 5 años.

**TRASTORNOS  
RELACIONADOS  
CON TRAUMAS Y  
FACTORES DE  
ESTRÉS**

<b>TRASTORNO DE RELACION DESHINIBIDA</b>	Se va con adultos extraños, recurre poco o nada del cuidador. Duración: Menos de 9 meses.	Prevalencia: Aparece en alrededor del 20% de los niños.	Factores: Ambientales y modificadores de curso.
<b>TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO POR UNA SUSTANCIA</b>	Vinculación con el estado de salud, preocupaciones por el aspecto.	Prevalencia: invariabilidad del paciente. Duración: Aproximadamente un mes.	Factores: Genéticos, biológicos y ambientales.
<b>TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO</b>	Alteraciones negativas cognitivas, incapacidad de recordar. Exposición a la muerte.	Prevalencia: Anual entre los adultos, adolescentes y niños. Duración: mayores de 6 años.	Factores: se divide en factores de pretraumáticos, peritraumáticos y posttraumáticos.
<b>TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO</b>	Recuerdos angustiosos recurrentes y sueños angustiosos. Duración: 3 días a 1 mes.	Prevalencia: las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar el trauma.	Factores: Temperamentales, ambientales y genéticos y fisiológicos.
<b>TRASTORNO DE ADAPTACION</b>	Malestar intenso desproporcionado o del comportamiento. Intentos de suicidios.	Duración: comienza dentro de 3 meses, y no dura más de 6 meses.	Factores: Medioambientales. Prevalencia: invariabilidad del paciente.
<b>TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA</b>	Perturbación de la identidad, que se caracteriza por la personalidad.	Prevalencia: disociativo entre los adultos, 1.6% varones y 1.4% de mujeres.	Factores: Ambientales modificadores del curso. Duración: A cualquier edad (desde la más tierna infancia hasta la vejez).
<b>AMNESIA DISOCIATIVA</b>	Incapacidad de recordar información. Duración: puede variar desde minutos hasta décadas.	Prevalencia: entre los adultos, 1.0% para los hombres y 2.6% para mujeres.	Factores: Ambientales, genéticos y fisiológicos y modificadores del curso.
<b>TRASTORNO DE DESPERSONALIZACION/ DESREALIZACION</b>	Experiencias de irrealidad, distanciamiento, o de ser un observador externo.	Duración: comienza a principios o mediados de la infancia.	Factores: Temperamentales y ambientales. Prevalencia: Sin especificado.

## FUENTES BIBLIOGRAFICAS

[DSM-5](#)

[www.medicapanamericana.com](http://www.medicapanamericana.com)

