



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesora: JULIBETH MARTINEZ GUILLEN

Tema: NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL

Materia: NUTRICION CLINICA

3CUATRIMESTRE LIC. EN ENFERMERIA

OROGASTRICA Y OROENTERICA Tubo introducido en la boca que llega al estómago hasta el intestino.



NASOENTERICA introducida a través de la nariz hasta el intestino.



Este tipo de alimentación se suministra a través de un tubo llamado sonda el cual puede colocarse desde la nariz o la boca hasta el estómago o el intestino.

Tipo de alimentación que permite administrar todos los nutrientes a través del tracto gastrointestinal cuando un individuo o puede tener una dieta normal



NUTRICION ENTERAL

Otra forma de administrar la NE es a través de estomias, que son un tubo directamente sobre la piel a nivel del estómago o del intestino administrada por 4 semanas.



La alimentación puede suministrarse por bolo a través de una jeringa o por gravedad, o bomba e infusión por 3 a 4 horas

NASOGASTRICA, el tubo es introducido a través de la nariz y llega hasta el estómago


Tipos de nutrición enteral a través de una sonda

GASTROSTOMIA,
DUODENOSTOMIA Y
YEYUNOSTOMIA

Nutrición Parenteral



La nutrición parenteral consiste en administrar en forma continua una solución hiperosmolar que contiene carbohidratos, proteínas, grasas y otros nutrientes necesarios a través de un catéter permanente insertado en la vena cava superior.



Vías parentales:
subcutáneas (BAJO LA
PIEL) intramuscular (EN
UN MUSCULO)
intravenosa (EN UNA
VENA)

Mescla de alimentos
especial líquido que se
provee a la sangre a
atruves de un catéter
(IV) intravenoso

NUTRICION PARENTAL



Se administra en pacientes desnutridos que no pueden alcanzar todos sus requerimientos por vía enteral especialmente en insuficiencia renal aguda.



