



**Nombre del alumno: ÁNGEL GABRIEL
GOMEZ GUILLEN**

**Nombre del profesor: Sandra Edith
moreno**

**Licenciatura: Medicina Veterinaria Y
Zootecnia**

Materia: zootecnia en aves

**Nombre del trabajo: vacuna y
desparasitaste en aves**

Ocosingo, Chiapas a 08 de Julio del 2023

Tarea Plataforma vacunas y desparasitantes

"Pollos De Engorde"

Vacuna de Newcastle

La vacuna de newcastle se aplica a los 7 días de nacido y se aplica a través del agua.
"Refuerzo cada 8-10 semanas"

Vacunas Gumboro

Vacuna de Gumboro

La vacuna contra la enf gumboro se aplica entre los 18-21 días de nacido y generalmente se aplica en el agua.

Vacuna de Marek

La vacuna se administra en pollos sanos que sean mayores de 18 días inyección.
El refuerzo es cada mes después de la apli

Fenbendazol

se usa para parásitos internos como gusanos redondos, gusanos cecales y otros
el des se usa cada mes.

Desparasitantes

Ivermectina

Es un medicamento utilizado para controlar parásitos internos y externos.
se usa cada 6 meses o 2 veces por año.

"Gallinas Ponedoras"

Vacunas { **Newcastle** } Se administra en gallinas ponedoras y es la vacuna viva atenuada. Estas cepas atenuadas pueden estimular una resp inmunologica que no causa la enf.

{ **Bronquitis infecciosa** } Solo uso en aves y esta vacuna nos ayuda para prevenir y se aplica el refuerzo cada 2 semanas. No todas las vacunas son recomendadas.

Desparasitantes { **Antihelminticos** } Son para controlar y o tratar las infecciones parasitarias causada por gusanos internos y se puede aplicar mediante el agua o inyectado.

{ **Ectoparasiticida** } Son productos usados para prevenir piojos o acaros que esten en la ave.

"Pavos de engorda o carne"

Influenza aviar { La vacuna se usa onde hay brotes de
Cia enfermedad para Prevencion
cada 8 semanas.

Vacunas Bronquitis { es una enfermedad que les da a pollos
Infecciosa y pavos que afecta problemas resp y
Cia aviar { se aplica como prevencion y es cada
10 semanas de aplicar.

"Las vacunas son para prevenir"

Desparasitantes { Levamizol { se usa para el control de nematodo
gastrointestinales.
Ivermectina { Amplio espectro para el control
de parásitos internos y
externos

Se desparasitan 2 veces al año
dependiendo su entorno onde vive.

"Goderis para carne"

Vacunas	Newcastle	La vacuna se aplica a partir de los 18 días de nacido
	Viruela aviar	Esta vacuna se puede aplicar para la prevención de la enfermedad y reducir su propagación.

Las goderis no se vacunan

Desparasitantes	Piperazina	Es utilizado para el control de nematodos gastrointestinales.
-----------------	------------	---

Bibliografía

- <https://www.grupolavet.com>
- <https://agrobiz.com>
- <https://avinews.com>
- <https://colaves.com>
- <https://www.engormix.com>