Enfermedades comunes en una explotacio porcina.

E.M.V.Z EDGAR YAEL DE LA CRUZ GÓMEZ
•UNIDAD 3. •6to CUATRIMESTRE.
ACT. PLATAFORMA

1. Dermatitis exudativa.

- **Signos clínicos.**
  - Manchas oscuras y grasosas en la piel.
- **Diagnóstico.**
  - Se realiza en base a las características de las lesiones cutáneas.
- **Prevención.**
  - Aislar animales afectados para prevenir la transmisión entre animales. Baño de lechones usando variedad de desinfectantes.
- **Tratamiento.**
  - La utilización de antibióticos.

2. Coccidiosis.

- **Signos clínicos.**
  - Diarrea, fiebre, inapetencia, pérdida de peso, emaciación y, en casos extremos, la muerte.
- **Diagnóstico.**
  - El diagnóstico presuntivo de esta enfermedad se basa en la evaluación del cuadro clínico y la mala respuesta al tratamiento con antibióticos.
- **Prevención.**
  - Instaurar un tratamiento oral con sulfaxarolin en los lechones de 3 a 5 días de edad, antes de que resulten infectados.
- **Tratamiento.**
  - Instaurar un tratamiento oral con sulfaxarolin en los lechones de 3 a 5 días de edad, antes de que resulten infectados.

3. Enfermedades respiratorias.

- **Signos clínicos.**
  - Estornudos a menudo con manchas de sangre.
  - Lagrimeo.
  - El hocico se tuerce, se acorta y arruga.
  - Reducción de la ganancia diaria y crecimientos variables.
  - Reducción de la eficiencia de conversión del pienso.
  - Aumento de las enfermedades respiratorias.
- **Diagnóstico.**
  - Fiebre, escalofríos, disnea, enrojecimiento de la piel, jadeo áspero, edema en párpados, conjuntivitis, depresión, anorexia y diarrea.
- **Prevención:**
  - Evitar la humedad en el área del cerdo, protegerlo contra el viento directo.
- **Tratamiento.**
  - Usar vacunas preventivas y alimentos medicados también puede ayudar a prevenir y tratar una enfermedad respiratoria.

4. Disenteria porcina.

- **Signos clínicos.**
  - Diarrea pastosa, que mancha la piel del perine debajo del ano.
  - Inicialmente la diarrea tiene color marrón claro con moco de consistencia gelatinosa e Fiebre moderada.
  - Tinte de hepatitis.
  - Pérdida parcial del apetito.
  - Algunos casos de muerte súbita.
- **Diagnóstico.**
  - Signos clínicos de diarrea con sangre y moco.
- **Prevención.**
  - Proporcionar agua limpia y abundante. Mantenga a los cerdos sueltos con poca humedad y un confort térmico del medio ambiente.
- **Tratamiento.**
  - Deben ser tratados con antibióticos; el fármaco de elección es la tiamulina, si bien la lincomicina es también eficaz en la mayoría de los casos.

5. Mastitis.

- **Signos clínicos.**
  - Inflamación de las mamas, inflamación del útero y escasez de leche.
- **Diagnóstico**
  - Fiebre puerperal, fiebre de cumada, fiebre láctica, así llama el ganadero a las enfermedades que padecen las cerdas tras el parto.
- **Prevención.**
  - La mejor acción preventiva contra el síndrome MMA es una buena higiene.
- **Tratamiento.**
  - El tratamiento regularmente incluye el uso de antibióticos y medicamentos para reducir la inflamación y la inyección de productos que estimulen la producción de leche.

6. Parvovirus porcino.

- **Signos clínicos.**
  - No hay síntomas físicos de PPV, sólo los signos clínicos, tales como la reducción del tamaño de la camada, el aumento de número de nacidos muertos, lechones momificados y lechones posiblemente de bajo peso al nacer.
- **Diagnóstico.**
  - El diagnóstico clínico se hace mediante la observación de los problemas reproductivos, como son las repeticiones, la presencia de camadas pequeñas y animales momificados de diferentes tamaños y la ausencia de abortos.
- **Prevención.**
  - Es importante realizar un buen programa de aclimatación de las hembras de reemplazo (vacunación y exposición a otras hembras adultas en el periodo de aclimatación).
- **Tratamiento.**
  - No hay tratamiento.

Presented with xmind