



ENFERMERIA DEL ADULTO

DOCENTE: LIC. ESTEFANY HERNANDEZ

TRABAJO: CUADRO SINOPTICO

ALUMNA: NOEMI C. PUERTO

TUBERCULOSIS

La tuberculosis es una enfermedad grave que afecta principalmente los pulmones. Los microbios que causan la tuberculosis son un tipo de bacteria.

TIPOS

TUBERCULOSIS LATENTE

Se está infectado de tuberculosis, pero la bacteria en el organismo está en estado inactivo y no presenta síntomas.

TUBERCULOSIS ACTIVA

También llamada enfermedad de tuberculosis, esta afección te enferma y, en la mayoría de los casos, puede contagiarse a otras personas. Puede manifestarse semanas o años después de la infección por la bacteria de la tuberculosis.

SINTOMAS

- Tos que dura tres semanas o más
- Tos con sangre o moco
- Dolor en el pecho o dolor al respirar o toser
- Pérdida de peso involuntaria
- Fatiga
- Fiebre

La tuberculosis también puede afectar otras partes del cuerpo, incluidos los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Cuando la tuberculosis se produce fuera de los pulmones, los signos y síntomas varían de acuerdo con los órganos afectados.

FACTOR DE RIESGO

RIESGO DE INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS

- Vivir con alguien que tiene tuberculosis activa.
- Vivir en una comunidad identificada como de alto riesgo de tuberculosis.

RIESGO DE DESARROLLAR TUBERCULOSIS ACTIVA

- VIH o SIDA
- Diabetes.
- Enfermedad renal grave
- Cáncer de la cabeza, el cuello o la sangre
- Malnutrición y peso corporal bajo

GASTROENTERITIS

La gastroenteritis viral es una infección intestinal que incluye la presencia de signos y síntomas como diarrea acuosa, calambres estomacales, náuseas o vómitos y, a veces, fiebre.

SINTOMAS

- Náuseas, vómitos o ambos.
- Dolor y calambres estomacales.
- Dolores musculares o dolores de cabeza ocasionales.
- Fiebre baja.

Según la causa, los síntomas de la gastroenteritis viral pueden aparecer entre uno y tres días después de contraer la infección y pueden variar de leves a graves.

CUANDO CONSULTAR AL MEDICO

ADULTOS

- Si no puedes retener líquidos en el estómago por 24 horas
- Si tuviste vómitos o diarrea durante más de dos días
- Si tienes vómitos con sangre

BEBES Y NIÑOS

- Tiene fiebre de 102 °F (38,9 °C) o más
- Parece estar cansado o muy irritable
- Siente mucha molestia o dolor
- Tiene diarrea con sangre

CAUSAS

NOROVIRUS

El norovirus, la causa más frecuente de enfermedades transmitidas por alimentos en todo el mundo, afecta tanto a niños como a adultos.

ROTAVIRUS

Generalmente contraen la infección cuando se llevan a la boca los dedos u otros objetos contaminados con el virus. Asimismo, se puede propagar a través de alimentos contaminados. La infección es más grave en bebés y niños pequeños.