



Mi Universidad

Cuadro comparativo.

Nombre del Alumno: **HERNÁNDEZ URBINA ANTONIO RAMÓN.**

Nombre del tema: **SUSTANCIAS (DROGAS) SUSCEPTIBLES DE ABUSO.**

Parcial: **CUARTO.**

Nombre de la Materia: **CRECIMIENTO Y DESARROLLO BIOLÓGICO.**

Nombre del profesor: **DR. MAZA LÓPEZ MIGUEL.**

Nombre de la Licenciatura: **MEDICINA HUMANA.**

Cuatrimestre: **SEPTIMO.**

NOMBRE DE LA SUSTANCIA:	TABACO.	MARIHUANA.	COCAÍNA.	META FENTAMINAS.
TIPO DE SUSTANCIA:	Estimulante del sistema nervioso central.	Alucinógeno.	Estimulante del SNC.	Estimulante del SNC.
FORMA DE CONSUMO:	Fumada.	Fumada en forma de cigarrillo o en pipa.	Fumada, ingerida, inhalada.	Fumada, inyectada, oral.
ORIGEN Y PRODUCCIÓN:	Química.	Natural.		Sintética.
EFFECTOS A CORTO PLAZO:	Machas en los dientes, caries dentales, mal aliento, mal olor corporal.	Euforia, alteración en la memoria reciente, disminución de la capacidad para realizar tareas que precisan una atención dividida y distorsión de la percepción del tiempo.	Euforia, incremento de la actividad motora, disminución de la fatigabilidad y alerta mental.	Taquicardia, hipertensión arterial y anorexia.
EFFECTOS A LARGO PLAZO:	Tos crónica, la producción de esputo, las sibilancias, agravamiento del asma.	Supresión dependiente de la dosis de la concentración de testosterona plasmática y de la espermatogénesis, síndrome amotivacional, ansiedad, depresión, mal rendimiento	Ansiedad, irritabilidad, psicosis paranoide.	Lesiones cerebrovasculares y psicosis, retracción gingival marcada con caries dental, infección por VIH, virus de la hepatitis B y C.

		laboral y de aprendizaje, faringitis, sinusitis, bronquitis y asma.		
POTENCIAL ADICTIVO:	Adictivo.	Adictivo.	Alto y progresivo.	Adictivo.
TRATAMIENTO EN INTOXICACIÓN AGUDA Y SOBREDOSIS:	Terapia de reemplazo de la nicotina.		Terapia cognitiva conductual. Dexanfetamina de liberación prolongada oral.	Haloperidol o droperidol.

NOMBRE DE LA SUSTANCIA:	ALCOHOL.	INHALANTES.	HEROÍNA.
TIPO DE SUSTANCIA:	Depresor del sistema nervioso central.		Opiáceo.
FORMA DE CONSUMO:	Ingerido.	Inhalada.	Inyectada, esnifar y fumada.
ORIGEN Y PRODUCCIÓN:		Química.	Sintética.
EFFECTOS A CORTO PLAZO:	Euforia, inestabilidad, verborrea, trastornos de la memoria reciente y eleva el umbral del dolor.	Efectos psicoactivos. Euforia, disartria, disminución de la coordinación y mareos.	Euforia, disminución del dolor, rubefacción cutánea e intensa miosis.
EFFECTOS A LARGO PLAZO:	Gastritis erosiva aguda, pancreatitis aguda, cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares.	Lesión cerebral extensa, anomalías cognitivas.	Abscesos, estreñimiento, abstinencia.
POTENCIAL ADICTIVO:	Alto.	Adictivo.	Adictiva.
TRATAMIENTO EN INTOXICACIÓN AGUDA Y SOBREDOSIS:	Depresión respiratoria: soporte ventilatorio artificial. Plantear la diálisis cuando la alcoholemia sea mayor de 400 mg/dl.		Mantener una oxigenación adecuada, administración de naloxona.