



Formulario

Nombre del Alumna: Daniela García Penagos

Nombre del tema: Fármacos

Parcial: II Grupo: A 3° semestre

Nombre de la Materia: Farmacología

Nombre del profesor: Dr. Miguel Basilio Robledo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Fecha y lugar: Tapachula, Chiapas 14 de octubre de 2023

Fármaco	Indicación	Dosis y Administración	Efectos Adversos	Contraindicaciones
Acido acetilsalicílico Aspirina V.O	Migrañas, dolor, fiebre en la dismenorrea, osteoartritis y artritis reumatoide.	Adulto 325-650 mg q/4-6hr Niños 10-15 mg/kg 4-6 hrs.	Gastrointestinal Hiperacidez Hicencia hepática Erupción cutánea, urticaria Dronociprismo pérdida de la audición y en ciegos.	Hipertensión Embarazo Úlcera péptica Anemia Niños (adolecentes) con varicela.
Aspirina V.O	Artritis reumatoide juvenil, la osteoartritis, artritis gotosa aguda, analgesico dismanorrea.	Adulto 275-500mg (2 veces al día) Niños >5 años 10mg/kg/día Tubeta, Suprendor.	Prostatias Gastricas, Vomito, diarrea hemorragia gástrica, úlceras disfunción renal.	Antecedentes de Úlcera Gastrointestinal Hipertensión Embarazo Lactancia.
Indometacina V.O / Rectal	Fármaco de elección de espondilitis anquilosante Síndrome de Reiter. Controla fiebre en Hodgkin.	25-50mg 2/3 o 2 veces al día Capsulas 25, 50, 100 mg Supositorios de 50mg	Anorexia Náuseas diarrea, dolor abdominal hemorragia gastrointestinales Vertigo, cefalea somnolencia alucinaciones.	Úlcera Gastritis y Hemorragia del tracto gastrointestinal.

P
 I
 N
 F

Farmaco	Indicación	Dosis / Presentación	Reacción adversa	Contraindicación
Ibuprofeno	Pacientes con dolor leve a moderado se acompaña de inflamación dismenoreu primaria. Pautante conartritis reumatoide y osteoartritis	Adultos 400mg/18h Niños mujeres de años 15mg/kg/dosis	Úlceras, vómitos, molestias epigástricas erupción cutánea setacea, mareo, visión borrosa.	En pacientes hipersensibles al fármaco durante embarazo y lactancia.
Etodolaco	V.O y parental dolor leve a moderado, artritis reumatoide y osteoartritis	200-300 mg dos veces al día. Cápsulas: 200 y 300mg. Amfolla 100mg	Alteraciones gastrointestinales y úlcera gastroduodenal	En caso de antecedente de úlceras gastroduodenales hipersensibilidad al componente
Piroxicam.	Planejo crónico de artritis reumatoide osteoartritis. Trastorno músculo esquelético agudo gata aguda, dda postquirúrgico dismenoreu	20mg/1vez al día. Cápsulas: 10-20mg Gel, crema, pbe ingectable.	Alteraciones gastrointestinales. Úlcera péptica.	En caso de hipersensibilidad. Pacientes con úlcera péptica.

Indicaciones	Dosis/preparaciones	Reacciones adversas	Contraindicaciones
<p>Via oral. Si signos y síntomas de artrosis, poliartritis reumatoide de en los adultos, espondilitis anquilosante.</p>	<p>200 mg una vez al día, fresco-nada con los alimentos. Capsulas: 100 y 200 mg.</p>	<p>Dolor abdominal diarrea, vómito dispepsia y erupción cutánea</p>	<p>Alérgicos a las sulfas Aquellos que han tenido crisis asmáticas</p>

Categorías C

Celecoxib

Contraindicaciones

Advertencias

Enfermos que son hipersensibles al compuesto.

Farmacología	Indicaciones	Dosis / Administración	Precauciones	Condiciones
Metamizol	Fiebre severa o grave no controlada por otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos.	V.O 500 a 1,000 mg cl/6 u 8 h V.I - 1 a 2 g cl/12 h Tabletas: 250, 500 mg Amplifol 1 g Ampolletas 100 mg	Agranulocitosis anemia aplásica anemia hemolítica choque anafiláctico láctica broncoespasmo hipotensión G.I., setaheg diarrea, mareo	En caso de hipersensibilidad inusual renal o hepática síndrome de Churg adictiva embarazo y lactancia.
Clorinato de visina.	V.O, Parental Dolor moderado a intensa cuando se responde a otros analgésicos de menor potencia tóxica	100-250 mg cl/6 u 8 h Tabletas: 125 y 250 mg Ampolletas: 100mg	Náuseas vómito, dolor epigástrico diarrea, eris, somnolencia, mareo, euforia, y anemia hemolítica	En caso de hipersensibilidad intercambio de óxido nítrico activo o hemorrágica gastrointestinal
Diclofenaco	Lesiones musculoesqueléticas agudas, dolor agudo de hombro por sobrecarga o dismenorrea.	75-100 mg 2 a 3 veces al día en cápsulas bifásicos > 6 años 1 a 3 mg/kg por día. Fracción oral	Náuseas, vómitos síndrome gastrointestinal hemorrágica	Hipersensibilidad enfermedad acidopéptica en niños lactancia y embarazo

Antipiréticos.

Farmaco	Indicaciones	Dosis / Presentación	Efectos secundarios	C. Indicaciónes
Ketorolaco	V.O., parenteral Tratamiento a corto plazo de dolor agudo a moderado-grave	No debe exceder los cinco días. V.O. / Parenteral 10 mg c/6 h oral Parenteral: 10-30 e/8 h Comprimidos 10 mg Ampolleta: 10 y 30 mg/ml	En el uso prolongado y en altas dosis alteraciones G.I., edema hipertensión rash, prurito, somnolencia mareo, cefalea, sudación.	Hipersensibles Embarazo, lactancia, insuficiencia renal, hepática severa, úlcera gastroduodenal en evolución o anticoagulantes de warf o heparina o disgregación plaquetaria. En el asma.
Categoría: C	V.O y rectal Se utiliza como analgésico, antiinflamatorio, antihipertensivo, antiinflamatorio en síntomas respiratorios de vías aéreas altas y bajas coadyuvante en dismanorreca.	100 mg dos veces al día en adultos Tableta: 100 mg Supositorio: 50 y 100 mg Suspensión 15.	Adosis terapéuticas los efectos colaterales son poco frecuentes, por lo general lo que se puede prevenir es prurito, náuseas y gastralgia.	Pacientes con hipersensibilidad al producto hemorragia, gastrointestinal, alérgica o úlcera gastroduodenal activa, en el embarazo y niños menores de un año.
Categoría: C	Bimésulida.			

Farmacología

Antifotencia B.

Via endovenosa
Pacientes con
micosis sistémicas
graves
Causadas por:
Histoplasma
Candida albicans,
Blastomyces,
Dermatitidis,
Cryptococcus
Neoformans
Candida, aspergillus
Fungus

Flucitocina
(5-FC)

V.O / intravenosa
Se indica en
infecciones por
Candida y
Cryptococcus en
Caso de meningitis

Indicaciones

Dosis / Preparación

Efectos adversos

Contraindicación

Inyección intravenosa: 1 mg en solución de 250 ml de por 2 a 4 h
por efectos secundarios se aumenta hasta 50 mg/día
Amplética: 50 mg

100 mg - 150 mg/día
en cuatro tomas x 7-10 días
Capsulas: 250 y 500 mg
Amplética 250 mg.

Fiebre
Escalofríos,
EN SD-1 de los
pacientes defu
vómito, náuseas
h. potension
alteraciones
de la función renal
En 80% hipotensión
En coma puede
producir ~~braxeno~~
constricción

Depresión de
la función de
la médula
oseal: anemia,
leucopenia,
trombocitopenia
púuseas,
vómitos
diarrea y
entema.

Sojetos
que son
hipersensibles
al fármaco
y en los
comatidos

Individuos
que se
sabe son
hipersensibles
a el.

Categoría: C

Categoría: B

Antimicóticos

Farmaco	Indicaciones	Dosis / Presentación	Efectos adversos	Contraindicaciones
Griseoflovina Categoría: C	Actúa contra <i>Trichophyton</i> , <i>Microsporum</i> , <i>Epidermophyton</i> . Infecciones por dermatofitos en cuero cabelludo, piel y uñas.	Niños: 500 / 1000 mg al día (10 mg/kg/día) 1-15 meses: 125 y 250 mg Tableta: 250 / 500 mg.	Cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, sed excesiva, efectos en el sistema hepatotóxicidad.	Hipersensibles al componente y en personas con insuficiencia hepática.
Nistatina Categoría: C	En candidiasis bucofúngica, gastro intestinal vaginal, cutánea y mucocutánea.	Adulto: 250 000 U a 500 000 U 3-4 veces al día Niños: 500 000 U 1 vez al día Formas: suspensión, comprimidos, polvo.	Náuseas, vómitos, diarrea, irritación de la piel e infección sobreañadida.	Pacientes hipersensibles al fármaco.
Terbinafina Categoría: B	Tratamiento del dermatofitos de la piel, pelo y uñas.	Adulto: 250 mg una vez al día Tableta: 250 mg Crema, spray, solución.	Alteraciones gastrointestinales, erupción cutánea, cefalea, alteraciones en las pruebas de función hepática.	Hipersensibilidad al producto.

Farmaco	Indicaciones	Forma de elección	Reacciones adversas	Precauciones
Ketorolaco	Tratamiento de blastomiosis diseminada Histoplasmosis tífus, vulvovaginitis por candida Cándidiasis de boca, esófago mucocotánea crónica Micosis profunda	(Farmaco de elección) Vulvovaginitis: 400 mg una vez al día x 5 días Cándidiasis boca y esófago: 400 mg una vez al día por dos semanas. Micosis profunda: 400 mg una vez al día x 6-12 meses. Tableta: 200mg Envoltorio: 400mg Crema y Shampoo 2.1.	Reacciones E. Intestinales náusea y vómito dolor abdominal diarrea, estreñimiento anorexia, somnolencia fiebre, cefalea, depresión función urinario-nergica. Ocasionalmente hipofosfemia castrolar impotencia sexual, ginecomastia daño hepático	Personas hipersensibles a él. En caso de insuficiencia hepática. Embarazo y lactancia.

category C

Efectos secundarios	Indicaciones	Dosis / Frecuencia	Reacción adversa	Contraindicaciones
<p>Fluconazol</p>	<p>Farmacio de elección en las miosis sistemicas y oportunistas</p> <p>Blactomicosis</p> <p>Histoplasmosis</p> <p>no meningea</p> <p>histoplasmosis</p> <p>En SIDA, aspergillus</p> <p>Criptococosis</p> <p>Candidiasis</p> <p>bucofaríngea</p> <p>esofagica</p> <p>y vaginal.</p> <p>Onicomicosis</p> <p>Yina resistente</p> <p>O sinusopulvina</p>	<p>200 mg</p> <p>1 o 2 veces al día con los alimentos</p> <p>400 mg una vez al día.</p> <p>Capsulas de 100 mg</p>	<p>Alteraciones gastrointestinales</p> <p>Fatiga, somnolencia</p> <p>Fiebre, prurito,</p> <p>erupción cutánea</p> <p>depresión</p> <p>impotencia sexual</p> <p>y alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático</p>	<p>En caso de hipersensibilidad.</p> <p>Insuficiencia hepática</p> <p>Lactancia y niños.</p>

Ejemplo 10	Indicaciones	Dosis/ Presentación	Reacción adversa	Contraindicación
Fluconazol	Candidiasis orofaríngea esofágica y vaginal De elección para meningitis criptocócica. Infecciones urinarias por candida y la peritonitis.	100 mg V. 1 qd día. Candidiasis, vaginal 150 mg una sola toma. Tabletas: 50, 100, 150 mg Parenteral Zemplin en frasco de 100 y 200 ml	Pacientes que reciben el medicamento por más de 7 días como: náuseas, cefalea erupciones cutáneas, vómito, diarrea, dolor abdominal	Pacientes hipersensibles al componente
Voriconazol	Aspergelosis invasora y candidiasis sistémica causada por sepsis raras	400 mg una vez al día. V.O / Intravenosa	Disfunción visual y hepática	Durante el embarazo
Posaconazol	Aspergelosis refractaria Candidiasis bucofaríngea	100 mg dos veces al día el primer día y después una vez al día durante 13 días / suspensión 200 mg (5ml)	Diarrea, vómito, dolor abdominal, cefalea.	

Farmaco	Indicaciones	Dosis / Preparación	Reacción adversa	Contraindicaciones
Caspofungina	Efectividad sobre candida y aspergillus. Aspergicelosis invasora que no responde o no toleran la anfotericina B o el voriconazol	Inicial: 70 mg después para seguir 5 mg/día. Veno disolvente. Modo de administración: 100 ml de solución de 7 mg/ml en el frasco con 70 y 5 mg/ml. En plazo de 50 mg	Fiebre Fibrilación Trombofibrinólisis En el lugar de la infusión náuseas u ómigos, aumento de los enzimas hepáticos	En caso de hipersensibilidad
Categoría: C				
Antimicótico local	Tiña, candidiasis, queratitis, micosis superficiales	<p>APlicación cutánea.</p> <p>Crema, solución y loción a 1%.</p> <p>Chamúsca, aerosol 3 a 6 semanas</p> <p>Aplicación vaginal una vez al día 3-7 días.</p>		

Farmaco	Indicaciones	Dosis/Precaución	Reacciones adversas	Contraindicación
Aciclovir	De elección para el tratamiento de infecciones por herpes. Simple tipo I y II. Herpes virus genital, virus orolabial, herpes zoster, Epstein Barr, Citomegalovirus.	V. Oral líquida - venosa / tópica. H. Genital inicial: grave: V. 1 dosis de 5 mg/kg q8h por cinco días. H. Simple, Zóster diseminado por V. 1 5mg/kg q8h durante 7 días. V.O. 200mg cinco veces al día por 10 días, en recurrencias 200mg cinco veces al día por cinco días. H. Genital inicial y mucocutáneo: Pomada 6 veces al día por 7 días. Cu. psikas: 200 Tableta: 400, 800mg Ampolleta: 250mg	Náuseas vómitos cefalea El uso intravenoso puede ocasionar inflamación o plebitis en el sitio de la inyección Alteración de la función renal en S.I. de los pacientes debido a nefropatía cristalina Hematuria Erupción cutánea alerjico, temblor y convulsiones	En pacientes que son hipersensibles al fármaco, con actividad con tra la enfermedad hepática activa. Durante la lactancia.

Categoría: B.

Antivirales

<p>Cuanticlovir</p>	<p>De elección en la profilaxis y tratamiento de infecciones por citomegalovirus</p>	<p>v. intravenosa 5 mg/kg/12h durante 14-21 días. Cápsulas 250mg Ampollas 500mg Gel oftálmico</p>	<p>Mielosupresión Neutropenia In. intestinales E. Interm., fiebre Mal estar y alteración de la función tanto hepática y renal</p>	<p>Pacientes con hipersensibilidad enfermedad hepática crónica. Durante el embarazo. Lactancia</p>
<p>Foscarnet</p>	<p>Activo frente a herpesvirus y HIV. Zoster por citomegalovirus Resistente a ganciclovir y ceftiovir de herpes virus resistentes a aciclovir</p>	<p>60 mg/kg/8h Infusión de 1h o 90 mg/kg/12h en 2h durante 14-21 días Seguidos de dosis de mantenimiento 90/120 mg/kg/12/24h en infusión de 2h Se presenta en ampolla 24 mg/ml</p>	<p>Neurotoxicidad Síntomas de hipocalcemia como parosismos carilímicos y convulsiones.</p>	<p>En caso de hipersensibilidad.</p>

Categoría: C

Categoría: C

Forma de uso	Indicación	Dosis/preparación	Reacciones adversas	Contraindicaciones
Cunículo v.v	De elección en la profilaxis y tratamiento de infecciones por citomegalovirus	V. Intravenosa 5 mg/kg/12h durante 14-21 días. Cápsulas 250mg Ampolletas 500mg Inyección oftálmica	Mielosupresión Neutropenia D. Intestinales Eritema, fiebre Malestar y alteración de la función tanto hepática y renal	Pacientes con hipersensibilidad enfermedad hepática activa Durante el embarazo. Lactancia
FDS carnet	Activo frente a herpesvirus y HIV. Rinitis por citomegalovirus que son resistentes a ganciclovir y ceftio de herpes virus resistentes a aciclovir	60 mg/kg/148h infusión de 1h o 90 mg/kg/112h en 2h durante 14-21 días Seguidos de dosis de mantenimiento 90/120 mg/kg/124h en infusión de 2h Se presenta en ampolla 24 mg/ml	Neurotoxicidad Síntomas de hipocalcemia como parosismos arritmias y convulsiones.	En caso de hipersensibilidad.

Categoría: C

Categoría: C

Farmaco	Indicaciones	Dosis/preparación	Reacciones adversas	Contraindicaciones
Ribavirina	<p>Acroard en niños con bronquiolitis severa y neumonía producida por virus sincitial respiratorio</p> <p>Tratamiento de hepatitis C vírica.</p>	<p>V.O. Levorotol</p> <p>Adulto: 400mg 3 veces al día y para niños dosis usual de 15 - 25 mg/kg por día dividido en tres tomas.</p> <p>Capsula: 200, 400mg</p> <p>Frasco: 100ml</p> <p>otros: solución oral, crema, inyección oral</p>	<p>Por aerosol ocasiona irritación conjuntival y bronquial</p> <p>Por V.O causa náuseas, vómito, anemia hemolítica</p>	<p>Hipersensibilidad</p> <p>Insuficiencia renal severa y durante el embarazo.</p>
<p>vidarabina</p> <p>2 al 90 mg · C</p>	<p>Efectivo contra herpes simple virus varicela, Zóster y el citomegalovirus</p> <p>Encefalitis (HS)</p> <p>Herpes neonatal</p> <p>Inmunocomprometidos con infecciones por varicela, Zóster y citomegalovirus</p> <p>quechitis aguda y superficial.</p>	<p>10-15 mg/kg/día</p> <p>Vía intravenosa</p> <p>Vía tópic</p> <p>unguento a 31.</p> <p>Ampollas de 200mg.</p>	<p>Dácteos</p> <p>diarrea</p> <p>Vómitos</p> <p>Encefalopatía relacionada con neuropalcos, mareos</p> <p>Confusión, ataxia</p> <p>tremores que puede progresar a estado de coma</p>	<p>Pacientes hipersensibles</p> <p>Los que sufren insuficiencia renal.</p>

Farmacos	Indicaciones	Dosis/Preparación	Reacciones adversas	Contraindicaciones
Zidovudina Categoría: C	De la ercción profilaxis de la infección por virus de la inmunodeficiencia A.	100 mg dos veces al día Capsula: 100 mg Jarabe 50mg/ml Tabletas, solución inyectable.	Malestar gástrico intestinal insuficiencia cardíaca trastornos etc SNC mareo, dificultad para hablar y convulsiones	Sujetos con insuficiencia cardíaca.
Zalcitabina Categoría: C	V. O. Prevención y tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia	75 mg/12h por síndico Capsula: 75mg Polvo para preparar la suspensión	náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea.	Hipersensibilidad
Imiquimod Categoría: C	Para verrugas genitales y penitales para los dos por HPV	Adm. Tópica Crema 5%	Eritema, erosión descamación edema	

Farmaco	Indicación	Composición	Reacciones adversas	Contraindicaciones
Lamivudina Categoría: C	Pacientes infectados por HIV, V. ros de hepatitis B.	150 mg o 15ml de solución oral 3 veces al día. comprimido de: 150mg / solución oral de 10mg/ml	Neurotoxicidad Neuropatía Periférica, Parálisis, Hepatitis. Cefalea, náuseas, diarrea, erupción cutánea, dolor	En caso de hipersensibilidad
Indavir Categoría: C	Tratamiento de la enfermedad de HIV en combinación con otros retrovirales	V. Oral se recomienda 800mg q8h capsulas: 200-400 mg.	Astenia, fatiga, dolor abdominal, náusea, sequedad de la piel, prurito, erupción cutánea	Pacientes con hipersensibilidad
Zidovudina Categoría: C	AZT se emplea en tratamiento de personas con infección por HIV. Asintomáticos o con síntomas o avanzada.	V. Oral Adulto: 200mg 3 veces al día 300mg dos veces al día. Capsula: 100 mg Tableta: 300mg Solución inyectable Solución oral	Mielosupresión Menipcytosis por anemia, 0 neutropenia cefalea, fiebre, mareos, vómito, parálisis, náuseas, erupción, insomnio, dolor muscular.	En los pacientes con depresión de médula ósea.

Forma de	Indicaciones	Dosis/Regimen de Dosis	Efectos Adversos	Contraindicaciones
Albendazol	Antielmintico contra parásitos Ascaris lumbri- colides, tenia- saginata, oxi- uris, toxo- caris Ascariasis, tenia- sis, equinocosis	De 1 elección Ascariasis/ paratuberculosis 400 mg una sola toma. \downarrow Al día x 3 días 15 mg/kg/día x 2 veces al día por 21 días paratuberculosis	Diarrea, cólicos abdominales, embriotoxicos teratogénos anorexia, sefalo- mareo, náuseas vómito,	Hipersensi- bilidad Mujeres embarazadas Niños < 2 años. Con cuidado en cirrosis hepática
Mebendazol	Ascariasis, teniasis, Efectivo contra infecciones intesti- nales por nematodos incluyendo teniasis y ascariasis. Enteroobiosis.	N.O. intravenoso t ópica. Ascaris 100 mg dos veces al día. teniasis y toxo- caris 200 mg 2 veces al día por 3 días consecutivos. 3 días consecutivos. Tabletas medicables 100 y 500 mg y suspensión oral	Nervosidad Dolor abdominal transitorio. Diarrea, efecto embriotoxicos teratogénos	Hipersensi- bilidad al compuesto Colitis ulcerosa lactancia Embarazo

Antiparasitarios

Metronidazol	<p>Activa contra bacterianas Eubacteroides fusobacterium gram(+) (lostridium eubacterium H. pylori B. vaginalis E. histolytica Giardiasis Tricomoniasis De la caeion para infeccion fistula proctitis de neumon colonica</p>	<p>V. D / T - Epica Intravenosa Amibiasis 500mg 3 veces al dia por 5-10 dias Tricomoniasis y giardiasis: 250- 500mg 3 veces al dia x 7 dias. Tabletas: 500mg Ampolletas: 500mg Ovulos: 250mg Suspension, crema, gel.</p>	<p>Leve irritacion u bmitos, andorexia, mareo</p>	<p>Interaccione con alcohol de emborazo E. karingsa de alcohol durante el primer trimestre de embarazo E. karingsa de alcohol durante la administracion.</p>
Disolubilidad	<p>Ambiasis infectiva por radoros com- tomaticeo</p>	<p>650mg 3 veces al dia x 20 dias Tabletas: 650mg Suspension</p>	<p>Alteracion en Intestinales Fiebre, erupcion cutanea Gravimienta de la glandula tiroides piel color amarillo y de cabello</p>	<p>hipersensibilidad al godo. insuficiencia hepatica grave enfimidad de fivoides leucemia</p>

Efectos secundarios	Indicaciones	Aviso / Precauciones	Contraindicaciones	Precauciones
Dimetilmiflo	P. Vivax ovale malware (cepas) superfibras de P. Falciparum Pakodimo Resistente a nacloroquina toxoplasmosis Tabletas: 25mg	Toxoplasmosis 1- 100mg dos semanal día por el 1. día, segunda 50-75mg diarios durante 3/6 semanas pakodimo: 75mg dosificación	Anorexia, Vómito A dosis altas problemas anémica megablástica Leucopenia	Hiperensibilidad Anemia megablástica Leucopenia Insuficiencia hepática
Primaquina	De elección para erradicación de formas tach vas de P. vivax y P. ovale. Usamo no pneumocystis jivoreci.	15 mg/día x 14 días 15-30mg/día durante 14 días Tabletas de 15 y 5mg.	Metabemo- globinemia Dolor abdominal Hemolisis	Enfermos con alteraciones hematológicas
Quinina	P. metformica antiquodico De elección para P. Falciparum sexo	650mg Cl/8h durante 10-14 días Tabletas 300mg	Cinconismo Sordera náuseas vértigo alteraciones de la visión	Hipersensibilidad aritmias cardíacas Embarazo y lactancia.

Antigeno: D

Farmaco	Indicaciones	Dosis Preoperatoria	Efectos secundarios	C. 1
Cloroquina Categoría: C	Principales agentes contra el paludismo malarico. Malaria resistente	Paludismo: 1. Dosis: 600 mg inicial, después 300 mg a las 6, 24, 48 horas. 2. Dosis: 300 mg una vez al día 3. Dosis: 300 mg una vez al día 4. Dosis: 150 mg	Gastrointestinales Prurito, erupción Hipotensión, arterial, trastornos visuales, caída del cabello y cardiomegalia.	Hiper sensibilidad al compuesto retinopatía glaucoma psoriasis úlcera péptica y durante la lactancia.
Mefloquina Categoría: C	De elección para profilaxis paludismo causado por cepas de P. falciparum resistentes a la Cloroquina.	250 mg una vez por semana 250 mg	Náuseas, vómitos, fiebre, erupción cutánea diarrea dolor abdominal cefalea psicosis crisis tónico-clónicas	No se recomienda en pacientes con epilepsia, trastornos psiquiátricos, arritmias, Trastornos de conducción auricular.

Anti-histaminicos

Farmaco	Indicacion	Dosis/Preparaciones	Reacciones	C.I.
<p>Categoría: B</p> <p>Clorfeniramina</p>	<p>V. O. Intravenosa - Rinitis alérgica Urticaria Reacciones alérgicas a medicamentos alimentos y a picaduras de los insectos</p>	<p>V. O 2.5 - 5 mg C/4 a 6 h V. I 10 mg Segura la intensidad de la alergia. 10 - 50 mg Cl 4 a 6 h 400 mg / alio dosis max 1 mg</p>	<p>G. Intestinales Sequedad de la boca, vómito Somnolencia Sedación, confusión, fatiga, visión borrosa, temblores, agravia hipotensión</p>	<p>Pacientes con hipertrofia prostática glaucoma asma e hipersensibilidad</p>
<p>Difenhidramina</p>	<p>V. O. Oral Reacción alérgica debida a la liberación de histamina.</p>	<p>V. O 2.5 - 50 mg C/4 a 6 h V. I 10 mg Segura la intensidad de la alergia. 10 - 50 mg Cl 4 a 6 h 400 mg / alio dosis max 1 mg</p>	<p>Alteraciones gastrointestinales sedación, visión borrosa, retención urinaria, fatiga confusión, hipo- tensión y los temblores.</p>	<p>En pacientes con obstrucio- n, prostatica y de vías urinarias en niños que son prematuros lactantes durante la lactancia, asma, úlceras pépticas, glau- coma hipotónico postoperatoria.</p>

Farmaco	Indicaciones	Posología/representación	Reacciones adversas	Contraindicaciones
Loratadina	v. oral Síntomas que son relacionados con rinitis alérgica. Estornudos, rinorrea, prurito urticaria gónica Otras afecciones dermatológicas alérgicas.	10 mg / 24h en adultos y mayores de 12 años Tableta: 10mg Jurbete Gotas, solución oral.	Urticaria, boca seca, somnolencia, cefalea y la fatiga.	Pacientes con antecedentes alérgicos al medicamento o alguno de los componentes de la fórmula C.I.: En el embarazo y en la lactancia.
Desloratadina	Rinitis alérgica urticaria urticaria idiopática	5mg v.o C.I. 24h Tableta 5mg y suspensión	Sequedad en la boca, somnolencia, cefalea.	Contraindicaciones

Categoría: C

Categoría: B

Contraindicaciones

Farmaco	Indicaciones	Posología y presentación	Reacción adversa	Precaución
Fexofenadina Categoría: C	Alivio de síntomas que están relacionados a rinitis alérgica y urticaria crónica	120 mg una vez al día en personas con olefno renal se recomienda dosis inicial de 120 mg c/148 h		
Levocetirizina. Categoría: B	Rinitis alérgica crónica idiopática.	5 mg una vez al día Tableta 5mg	Somnolencia Fatiga Astenia.	

Bibliografía

Chéry, P. M. A., & Mitchel, P. (2013). Manual de Farmacología Básica y Clínica