

Trastorno	Definición	Etiología	Factores de riesgo	Diagnóstico	Tratamiento
<p>Trastorno depresivo mayor.</p>	<p>Es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan acompañada de una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias, durante 14 días.</p>	<p>Las causas se han descrito como multifactoriales, asociados con el inicio y mantenimiento y recurrencia de la depresión. Se ha propuesto una sólida interacción entre vulnerabilidad biológica, psicológica y ambiental. Esta descripción se ha relacionado entre las variables genéticas con enfoque al sistema monoaminas (serotonina, 5-hidroxi triptamina (5HT)-norepinefrina (NE), dopamina (DA)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biología (consumo de sustancias o alcohol)</li> <li>• Familiar</li> <li>• Abuso</li> <li>• Psicológico</li> <li>• Baja autoestima</li> <li>• Social</li> <li>• Acoso escolar</li> </ul>	<p>Menor a 7 años</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de energía para realizar cualquier actividad</li> </ul> <p>7 a 12 años</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afectiva y conductual</li> <li>- Cognitiva</li> <li>- Somática</li> </ul> <p>Adolescencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mismos síntomas que en la edad prepuberal</li> </ul> <p>Escala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CES-DC</li> <li>- MFG</li> <li>- DSRS</li> <li>- KADS</li> <li>- PHQ-A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertralina</li> <li>- Paroxetina</li> <li>- Fluoxetina</li> </ul>

Transtorno	Definición	Etiología	Factores de riesgo	Diagnostico	Tratamiento
<p>Ansididad En el adulto Mayor</p>	<p>Se caracteriza por angustia y preocupación excesiva por una serie de eventos y actividades que suceden alrededor de la persona que la padece, la preocupación y la ansiedad son difíciles de controlar y están asociadas a 3 de los siguientes síntomas que ocurren la mayoría de los días y por lo menos 6 meses.</p>	<p>Encuentran que los factores de riesgo que se asocian tanto a la incidencia como a la prevalencia de la ansiedad son: rasgos de personalidad, estrategias inadecuadas de afrontamiento, alteraciones psicológicas previas, aspectos cualitativos de la red social, la presencia de eventos estresantes y ser mujer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sexo femenino.</li> <li>• Enfermedad de crónicas degenerativas</li> <li>• Vivir sob, viuelo o divorciado</li> <li>• Baja escolaridad</li> <li>• Eventos estresantes a lo largo de su vida</li> <li>• Limitación física en actividades diarias.</li> </ul>	<p>Adultos jóvenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pánico</li> <li>• Transtorno de estrés posttraumático</li> <li>• Sueño</li> <li>• Depresión</li> <li>• Adulto mayor</li> <li>• Nivel menor de afectación cognitiva y somática</li> <li>• Mayor incidencia de obsesiones religiosas</li> </ul> <p>Escala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GAI y GAI-SF</li> </ul>	<p>Sertralina 25mg al día, por 6 meses.</p>

Transtorno	Definición	Etiología	Factores de Riesgo	Diagnostico	Tratamiento
<p>Depresión postparto</p>	<p>Una depresión postparto, que se define como un episodio de depresión mayor que es asociado temporalmente al parto, con un inicio dentro de los 12 meses siguientes al parto y que los síntomas deben estar presentes casi a diario durante al menos dos semanas.</p>	<p>No existe una causa específica de la depresión post parto, pero la genética, los cambios físicos y los problemas emocionales pueden contribuir. Genéticas, Los estudios de- muestran que tener anteceden- tes familiares de depresión postparto, sobre todo si fue grave, aumenta el riesgo de tenerla.</p>	<p>Antecedentes de este trastorno previamente al embarazo, de depresión anteriormente y carecer de mecanismo de apoyo eficaces. Intentos de suicidio Comportamientos inusuales Violencia intrafamiliar Drogadicción</p>	<p>Se presenta 12 meses después del parto</p> <p>Escala Ediburgo</p>	<p>Sertralina Paroxetina Fluoxetina Citalopram</p>

Transtorno	Definición	Etiología	Factores de riesgo	Diagnóstico	Tratamiento
<p><b>Déficit de atención e hiperactividad</b></p>	<p>TDAH se define como un trastorno del neurodesarrollo (NO disfunción ejecutiva) que se caracteriza por defecto en el control inhibitorio y dificultades con la memoria de trabajo, caracterizado por inatención desorganización e hiperactividad e impulsividad, presentándose en diferentes escenarios de la vida,</p>	<p>El TDAH es un trastorno de etiología heterogénea, multifactorial y compleja, en el que una serie de vulnerabilidades biológicas interactúan entre sí y con factores ambientales de la adversidad psicosocial, la psicopatología en padre y las experiencias adversas en la niñez.</p>	<p>Los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del TDAH incluyen la genética, el medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos clave del desarrollo.</p>	<p>• Presente en los niños de 6-11 años</p> <p>Escala Conners</p>	<p>Metilfenidato</p>