



Nombre del Alumno:

Arriaga Nanduca José Manuel

Nombre del Docente:

Dr Edwin Yoani Lopez Montes

Asignatura:

Psicología Médica

Actividad:

Cuadro Comparativo

Fecha:

22/11/2023

Tapachula Chiapas De Córdoba Y Ordoñez

	Trastorno depresivo mayor.	Trastorno por déficit de atención hiperactividad.	Depresión prenatal y postparto.	Trastorno de ansiedad generalizada en el adulto mayor (TAG).	Delirium
Definición	Se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y de pérdida de interés.	Trastorno del neurodesarrollo caracterizado por inatención.	Episodio de depresión mayor que es asociado temporalmente al parto.	Se caracteriza por angustia y por preocupación excesiva por una serie de eventos y act.	Es un trastorno agudo de la conciencia y la cognición que afecta individuos de cualquier edad.
Temporalidad	14 o más días 2 semanas	6 meses	Entre 6 y 16 semanas después del parto. 12 semanas	6 meses 65 años	Adulto mayor 75 años
Prueba de Diagnóstico	DS5 y CIB-10 Tamiz: PHQ9 CIDI - niños Tirada de beck	General CIB-10 / DSM-5 Tamiz: C de Bonner Niso CID	Dx DSM-5 Tamiz: Edimburgo	Tamiz GSI General DSM-5	Dx/Nivel hospitalario. CAM / DSM-100 Escala gen. DSM-5
Sintomatología	< 7 años: Altruismo, Depsito y Soño. 7 a 12 años: Ideas de muerte, etc... Adolescentes: Ideas de muerte.	Hiperactividad Déficit de atención. Impulsividad.	Sustitución de tristeza, Pérdida de interés.	Intranquilidad o impaciencia. Dificultad para concentrarse.	Hipactivo: deprimidos, sedados, somnolientos. Hipactivo: inquietos, ansiosos, preocupados.
Factores de Riesgo	No modificables: edad, intento de suicidio, intenciones de autolesionarse. Modificables: Ideas suicidas.	Edad en la comorbilidad: 8-11 años: 65.3% 12-15 años: 76.3%	Antecedentes de este trastorno del embarazo, depresión anteriormente, intentos de suicidios.	Vive solo, Viudo o divorciado. Enfermedades crónicas-degenerativas.	Hospitalización por condición m. Demencia previa Duración de estancia hospitalaria.
Tratamiento	TCC	TCC (rectificado)	TCC	<u>NO</u> Farmacológico TCC Farmacológico (ISRS)	<u>NO</u> Farmacológico Valoración de los factores, 24 hrs de l. Permite las visitas familiares, Promover la iluminación.