



**NOMBRE DEL ALUMNO: MIA ALEXANDRA ARRIOLA
COLLAZO**

DOCENTE: DR.EDWIN MONTES

PSICOLOGIA MEDICA

UNIVERSIDAD UDS

1ER SEMESTRE GRUPO A

	TRANS EN ADULTOS TORNO DEPRESIVO MAYOR	TDAH	DEPRECION PRENATAL POSPARTO	ANCIEDAD GENERALIZADA EN EL ADULTO MAYOR
DEFINICION	TRANSTORNO DEL ESTADO DE ANIMO QUE SE CARACTERISA POR LA PRECENCIA DE TRISTEZA Y PERDIDA DE INTERES QUE LAS PERSONAS DISFRUTABAN H CER DURANTE 14 DIAS	SE PRESENTA IMPERACTIVIDAD, IMPULSIBILIDAD, ALTERACIONES DE APRENDIZAJE	SE DEFINE COMO EPISODIO DEPRESIVO MAYOR ASOCIADO TEMPORALMENTE AL PARTO CON INICIO DENTRO 12 MESES SIGUIENTES EL PARTO	EL TAG SE CARACTERIZA POR AMGUSTIA Y PREOCUPACION EXCESIVA UNA SERIE DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SUCEDEN AL REDEDOR
CUADRO CLINICO	SE CARACTERIZA POR UNA TRISTEZA PRESISTENTE Y UNA FALTA DE INTERES O PLACER ACTIVIDADES QUE PREVIAMENTE ERAN GRATIFICANTES ES FRECUENTE QUE OCURRA CON CANSANCIO	HIMPERACTIVIDAD,IMPULSIBILIDAD MOVIMIENTOS IMOULSIVOS,INCAPACIDAD DE TERMINAR UNA TAREA	ANSIEDAD,IRRITACION ,TRISZA, LLANTO SIN PRECEDENTES, DISMINUCION O PERDIDA DE APETITO,PENSAMIENTOS DE MUERTE, INSOMIO,HIPERSOMNIA	TAQUICARDIA,HIPERVENTILACION,P RECION DE PECHO,HIPERACTIVIDAD,MIEDO ETC
DIAGNOSTICO	DSM-5 Y CIE-10	CIE-10	CIE-10	DMS-5
TAMIZ	PHQ-9 EN ADULTOS BECK 13 AÑOS	CONNER	ESCALA DE EDIMBURGO	GAI Y GAI-SF
FARMACOS	FLUCOXETINA,SERTRALINA	MELTIFELMINATO DE LIBERACION INMEDIATA	USAN INICADORES DE LA RECAUDACION DE SEROTONINA,LA SERTRALINA CAUSA MENOS DAÑO EN EL PRODUCTO	MINIMO DE 6 MESES SE RECOMIENDA SERTALINA, COMO LOS MAS EFICAZ
FACTORES DE RIESGO	EDAD.ANTECEDENTES DE SUICIDIO,MINORIA SEXUAL,ANTECEDENTES DE SUICIDIO,PROBLEMAS LEGALES	PROBLEMAS MEDICOS,PROBLEMAS FAMILIARES,ACADEMICOS,HABLA Y HABLA Y LENGUAJE, PSICOLOGICOS	CASOS DE DEPRECSION,INTENTOS DE SUICIDIO,HISTORIAL DE COMPORTAMIENTO IMPULSIVO	RELACIONES A LA ANCIEDAD,SEXO FEMENINO,ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS,VIVIR SOLO,VIUDO O DIVORCIADO