



Cuadro comparativo psicología medica

UNIDAD TRES
PRIMER SEMESTRE GRUPO A
FREDY CESAR PEÑA LOPEZ
21/NOV/23

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

DOCENTE :DC EDWIN YOANI LOPEZ MONTEZ

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR

TDAH

depreciación prenatal posparto

ANSIEDA GENERALIZA EL ADULTO MAYOR

DEFINICION

Trastorno de estado de animo que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una perdida de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan acompañado de incapacidad para llevar acabo actividades diarias, durante 14 o más días (OMS)

Se presentan hiperactividad, impulsividad, alteraciones de aprendizaje, déficit de atención

Se define como episodio depresivo mayor asociado temporalmente al parto con inicio dentro de los 12 meses siguientes al parto

El TAG se caracteriza por angustia y preocupación excesiva por una serie de eventos y actividades que suceden alrededor de la persona que la padece estan asociados a por lo menos tres de los siguientes síntomas que ocurren en por almenos 6 meses
Irritabilidad, fatigabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, impaciencia

CUADRO CLINICO

Se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Además, puede alterar el sueño y el apetito, y es frecuente que concurra con cansancio y falta de concentración. Varía por edad genero antecedentes educativos y culturales

Hiperactividad, impulsividad, patrón persistentes de conductas en niñez, movimientos impulsivos, incapacidad de terminar una tarea asignada, agresividad, conducta desafiante

Ansiedad, irritación, tristeza, llanto sin precedentes, disminución o pérdida del apetito, desatención de actividades importantes y pensamientos de muerte, insomnio, hipersomnia,

Taquicardia, hiperbentilacion, precios de pecho, temblor, sensación de ahogo, hiperactividad, habla apresurada, miedo, etc

DIAGNÓSTICO

DSM-5 Y CIE-10

CIE-10

CIE -10

DMS -5

TAMIZ

PHQ-9 EN ADULTOS, BECK (13 AÑOS)

Conner

Escala de edimburgo

GAI y GAI -SF

FARMACOS

Flucoxetina -sertralina - paroxetina

Metilfenidato de liberación inmediata

Se usan iniciadores de la recaudación de serotonina, la sertralina causa menos daño en el producto que otros fármacos, pero también se respeta fluoxetian, paroxetina

Mínimo de 6 meses se recomienda sertralina, cita logramos como los más eficaz

FACTORES DE RIESGO

Edad, antecedentes de suicidio, minoría sexual, antecedentes de suicidio familiar, problemas legales, factores biológicos: genero femenino, pubertad. Familiar: abuso sexual, negligencia. Social: acoso escolar, etc. Psicólogos: duelos, traumas, pérdidas

Problemas médicos, problemas familiares, académicos, habla y lenguaje, psicológicos, emocionales etc.

Casos de depresión anteriores, intentos de suicidio, historial de comportamiento impulsivo, carácter de mecanismo de apoyo eficaz

Relaciones ala ansiedad, sexo femenino, enfermedades crónicas degenerativas, vivir solo, viudo o divorciado, baja escolaridad, eventos estresantes