



Nahum Daniel Arriaga Nanduca

Dr. Edwin Yoani López Montes

Análisis de Encuesta

Psicología Médica

Universidad del Sureste

29/12/2023

Lo esperado era encuestar a 20 personas de la licenciatura en Medicina Humana, pertenecientes a 1ero, 3ros, 5to y 7to semestre, de los cuales solo el 15% si la realizo correctamente, quedando el otro 5% incompleto, porque decidieron no responderla.

Conforme a las encuestas que realizamos obtuvimos los siguientes resultados, que fueron, en el primer caso, acerca de humor deprimido, tristeza, en el 1er semestre no hay padecimiento alguno de esta enfermedad, en cambio, 3er semestre, solo tiene esta enfermedad, solo y únicamente si le preguntan.

Continuando, con la segunda pregunta se pudo observar que 1er semestre esta ausente con un 58.8 % de los otros semestres, es decir, no hay sentimiento de culpabilidad.

Con respecto al tema de suicidio, el 70.6 % esta ausente en el 1er semestre, y ahora con el 23.5% los alumnos desearían estar muertos o tienen el pensamiento de suicidarse.

Pasando al tema de insomnio precoz, estadísticamente el 41.2%, perteneciente al 3er semestre tiene dificultad ocasional para dormir, se toman mas de media hora para conciliar el sueño, y el 41.2% está ausente.

Con base del tema de insomnio intermedio, el 58.8% no tiene dificultad de insomnio, en el 1er primer semestre, y el otro 23.5% tienen dificultad de insomnio.

El 64.7% no tiene dificultad, y el 23.5% se despierta a primeras horas de la noche, pero se vuelven a dormir.

Y el 64.7% los alumnos de 1er semestre no tienen dificultad para trabajar, y el 17.6% los alumnos de 5to, tienen problemas para trabajar.

El 82.4% los alumnos de 1er semestre presentan problemas de pensamiento.

El 67.7% los alumnos de 1er semestre no presentan nada, y el 23.5% los alumnos de 5to, presentan de esa inquietud, por que no pueden estar sentados ni parados.

52.9% no hay dificultad ansiedad psíquica, y el 35.3% sufren de preocupación por pequeñas cosas.

También el 70.6% sufren de ansiedad, y el 26.5 % tienen signos de ansiedades.

En los síntomas somáticos generales, el 64.7% en 1er semestre no hay síntomas generales, el 23.5% 3er semestre tiene pesadez en las extremidades del cuerpo, dorsalgia, etc.

Y en los síntomas genitales, el 94.1% 1er semestre, está ausente.

El 82.4% están ausente.

En la pérdida de peso, el 88.2% la mayoría pierde 500 gr en una semana.


En conclusión, de acuerdo a todos los datos reunidos y clasificados, 1er semestre se encuentra en un estado normal,

porque quizás apenas están incorporándose a la carrera, pero si se vio porcentajes altos en diferentes preguntas acerca de 3eros y 5to semestre, a lo cual el primero esta dentro de depresión menor y el otro menor que depresión menor.

ESCALA DE DEPRESIÓN HAMILTON

NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS


Distribución de las puntuaciones totales



EDADES

¿Qué edad tienes?


17 respuestas



SEXO

Género

17 respuestas




- Masculino
- Femenino

LICENCIATURA

Licenciatura


17 respuestas



- Medicina Humana
- Medicina Veterinaria
- Enfermería
- Nutrición

SEMESTRE

Semestre
17 respuestas



- 1er semestre
- 3er semestre
- 5to semestre
- 7to semestre

CUESTIONARIO VALORES


Puntuación	Gravedad del cuadro
0-7	Estado normal
8-12	Depresión menor
13-17	Menos que depresión mayor
18-29	Depresión mayor
30-52	Más que depresión mayor

	Valores
	0
	1
	2
	3
	4

PREGUNTAS

Humor deprimido, tristeza (melancolía) desesperanza, desamparo, inutilidad


17 respuestas



- Ausente
- Expreso estas sensaciones solo si me preguntan
- Relato estas sensaciones espontáneamente
- Manifiesto estas sensaciones en comunicación verbal y no verbal de forma espontanea

Sentimiento de culpa


17 respuestas



- Ausente
- Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente
- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre los errores del pasado o malas acciones
- Siente que su estado actual es un castigo
- Oye voces acusatorias o de castigo o de denuncia y/o experimenta alucinacion...

Suicidio


17 respuestas



- Ausente
- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida
- Desearía estar muerto o tiene pensamientos de la posibilidad de morir
- Ideas de suicidio

Insomnio precoz


17 respuestas



- No hay dificultad
- Dificultad ocasional para dormir, le toma más de media hora conciliar el sueño
- Dificultad para dormir cada noche

Insomnio intermedio


17 respuestas



- No hay dificultad
- Esta desvelado o inquieto o se despierta varias veces durante la noche de forma espontanea
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión para levantarse de la cama (excepto por motivos de evacuar)

Insomnio tardío


17 respuestas



- No hay dificultad
- Se despierta a primeras horas de la noche pero se vuelve a dormir
- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama

Trabajo y actividades


17 respuestas



- No hay dificultad
- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos)
- Pérdida de interés en su actividad (discapacidad de la atención, indecisi...)
- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o discapacidad de la pro...
- Dejar de trabajar, solo se compromete en pequeñas tareas o no puede realiz...

Inhibición psicomotora (lentitud del pensamiento y palabra, facultad de concentración disminuida, disminución de la actividad motora)


17 respuestas



- Palabra y pensamientos normales
- Ligerο retraso en el habla
- Evidente retraso en el habla
- Dificultad para expresarse
- Incapacidad para expresarse

Agitación motora


17 respuestas



- Ninguna
- Juega con sus dedos
- No puede mantenerse quieto ni sentado
- Retuerce las manos, se muerde las uñas o los labios, se tira de los cabellos

Ansiedad psíquica


17 respuestas



- No hay dificultad
- Tensión subjetiva e irritable
- Preocupación por pequeñas cosas
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla
- Expresa sus temores sin que le pregunten


Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad tales como: gastrointestinales: sequedad de la boca, diarrea, eructos etc. cardiovasculares: palpi...recuencia de micción incrementada. Transpiración)

17 respuestas



Síntomas somáticos generales


17 respuestas



- Ninguno
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas. Algas musculares. Pérdida de energía o fatigabilidad
- Cualquiera de los síntomas bien definidos


Síntomas genitales (disminución del libido y trastornos mentales)

17 respuestas



Hipocondría


17 respuestas



- Ausente
- Preocupado por sí mismo (corporalmente)
- Preocupado por su salud
- Se lamenta constantemente, solicita ayuda

Pérdida de peso


17 respuestas



- Pérdida inferior a 500 gr en una semana
- Pérdida de peso de más de 500 gr en una semana
- Pérdida de más de 1kg en una semana

Perspicacia

17 respuestas



- Se da cuenta de que esta deprimido y enfermo
- Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso etc.
- No se había dado cuenta de su enfermedad