


**ESCALA DE  
DEPRESIÓN  
HAMILTON**

# NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS


Distribución de las puntuaciones totales



# EDADES

¿Qué edad tienes?


17 respuestas



# SEXO

Género

17 respuestas




● Masculino  
● Femenino

# LICENCIATURA

## Licenciatura

17 respuestas




- Medicina Humana
- Medicina Veterinaria
- Enfermería
- Nutrición

# SEMESTRE

Semestre






17 respuestas



- 1er semestre
- 3er semestre
- 5to semestre
- 7to semestre

# CUESTIONARIO VALORES


Puntuación	Gravedad del cuadro
0-7	Estado normal
8-12	Depresión menor
13-17	Menos que depresión mayor
18-29	Depresión mayor
30-52	Más que depresión mayor

	Valores
	0
	1
	2
	3
	4

# PREGUNTAS

Humor deprimido, tristeza (melancolía) desesperanza, desamparo, inutilidad


17 respuestas





## Sentimiento de culpa


17 respuestas



- Ausente
- Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente
- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre los errores del pasado o malas acciones
- Siente que su estado actual es un castigo
- Oye voces acusatorias o de castigo o de denuncia y/o experimenta alucinacion...

## Suicidio


17 respuestas



- Ausente
- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida
- Desearía estar muerto o tiene pensamientos de la posibilidad de morir
- Ideas de suicidio

## Insomnio precoz


17 respuestas



- No hay dificultad
- Dificultad ocasional para dormir, le toma más de media hora conciliar el sueño
- Dificultad para dormir cada noche

## Insomnio intermedio


17 respuestas



- No hay dificultad
- Esta desvelado o inquieto o se despierta varias veces durante la noche de forma espontanea
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión para levantarse de la cama (excepto por motivos de evacuar)

## Insomnio tardío


17 respuestas



- No hay dificultad
- Se despierta a primeras horas de la noche pero se vuelve a dormir
- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama

## Trabajo y actividades


17 respuestas



- No hay dificultad
- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos)
- Pérdida de interés en su actividad (discapacidad de la atención, indecisi...
- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o discapacidad de la pro...
- Dejar de trabajar, solo se compromete en pequeñas tareas o no puede realiz...


Inhibición psicomotora (lentitud del pensamiento y palabra, facultad de concentración disminuida, disminución de la actividad motora)

17 respuestas



## Agitación motora

17 respuestas




- Ninguna
- Juega con sus dedos
- No puede mantenerse quieto ni sentado
- Retuerce las manos, se muerde las uñas o los labios, se tira de los cabellos



## Ansiedad psíquica


17 respuestas



- No hay dificultad
- Tensión subjetiva e irritable
- Preocupación por pequeñas cosas
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla
- Expresa sus temores sin que le pregunten


Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad tales como: gastrointestinales: sequedad de la boca, diarrea, eructos etc. cardiovasculares: palpi...recuencia de micción incrementada. Transpiración)

17 respuestas



## Síntomas somáticos generales


17 respuestas



- Ninguno
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas. Algias musculares. Pérdida de energía o fatigabilidad
- Cualquiera de los síntomas bien definidos


## Síntomas genitales (disminución del libido y trastornos mentales)

17 respuestas



## Hipocondría


17 respuestas



- Ausente
- Preocupado por sí mismo (corporalmente)
- Preocupado por su salud
- Se lamenta constantemente, solicita ayuda

## Pérdida de peso


17 respuestas



- Pérdida inferior a 500 gr en una semana
- Pérdida de peso de más de 500 gr en una semana
- Pérdida de más de 1kg en una semana

## Perspicacia

17 respuestas



- Se da cuenta de que esta deprimido y enfermo
- Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso etc.
- No se había dado cuenta de su enfermedad