



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Itzel Balbuena Rodriguez.

Nombre del tema: Encuesta de depresión con Escala de Hamilton.

Nombre de la Materia : Psicología médica.

Nombre del profesor: Dr. Edwin Yoani López Montes

Nombre de la Licenciatura : Medicina Humana.

Parcial : 4to.

Semestre: 1° Grupo: "A"

Tapachula, Chiapas a 29 de Noviembre del 2023.

Dicho a los resultados encontrados tras la encuesta realizada a todos nuestros compañeros de los diferentes semestres de Medicina Humana, fueron un total de 20 personas del total de la población, en el que sólo el 15% se encargo de responderla, mientras que el otro 5% no respondió, hizo caso omiso.

Se observo que la mayor parte del conjunto de la población tiene 20 años, y que son pertenecientes al sexo masculino, con un (52.9%).

Hubo un mayor porcentaje o más bien hay más cantidad de alumnos en 3er semestre, juntando a ambos grupos.

Podemos determinar tras dicha investigación de datos, que en el caso de la pregunta de sentimiento de humor depresivo, es decir, tristeza(melancolía), desesperanza, entre otros síntomas más, en el grado de 1er semestre hay mayor persistencia en estar ausente o menos susceptibilidad de este tipo. En cambio, hablando del 3er semestre igualo a 1er semestre con el porcentaje de (41.2%) , pero aquí hay padecimiento de estos característicos síntomas solo y únicamente si se le preguntan.

Ahora bien, en de acuerdo a la pregunta del sentimiento de culpa, 1er semestre obtuvo un (58.8%), siendo así el más alto en ocupar el mayor rango y decir que es ausente ante los otros dos semestres.

Además, en esta pregunta de suma importancia como lo es el suicidio, da satisfacción el poder saber que el (70.6%) de alumnos tienen esta idea ausente, los chicos de 1er semestre. Y solo un (23.5%) desearía estar muerto o tiene pensamientos de la posibilidad de morir.

Con la pregunta de insomnio precoz, hubo una igualdad en el número de porcentajes (41.2%) pero con diferente criterio; en 3er semestre tienen dificultad ocasional para conciliar el sueño correctamente, y el otro está ausente, prácticamente no existe esta dificultad como tal.

En lo que respecta a insomnio intermedio, nos encontramos con que en 1er semestre el (58.8%) no tiene dificultades de insomnio, no pasan por dicha situación.

Y con (23.5%) si presenta dificultades para poder dormir adecuadamente, ya que se despierta espontáneamente varias veces en la noche, etc.

Insomnio tardío, es visible con un (64.7%) que los alumnos de 1er semestre no tienen dificultad alguna o que sea muy prolongado el conciliar el sueño.

Por otro lado, el (23.5%) de 3er semestre, se despierta a primeras horas de la noche para volverse a dormir nuevamente.

En caso de la pregunta de la afectación de trabajo y actividades, se comprobó que el (64.7%) de los alumnos de 1er semestre no tienen dificultad para trabajar, y solo el (17.6%) alumnos de 5to semestre, ellos realmente si tienen problemas para trabajar y hacer sus actividades.

En la 8va pregunta acerca de inhibición psicomotora nos pudimos dar cuenta que con el (82.4%) no hay problemas con sus funciones o capacidades mentales, hay palabras y pensamientos normales en alumnos de 1er semestre, de modo que el (17.6%) tiene dificultad para expresarse, formando parte del 7to semestre.

Correspondiente a la agitación motora el porcentaje de (67.7%) se cuenta con alumnos de 1er semestre que dicen no tener ninguno de estos síntomas, prácticamente son como manías, pero, sin embargo, un (23.5%) de los alumnos de 5to si sobresalen por tener inquietud; es decir, no pueden permanecer sentados o parados.

En la actividad psíquica el (52.9%) no tiene dificultad de ansiedad psíquica, el segundo lugar lo ocupa con (35.3) alumnos con preocupación por pequeñas cosas, siendo 5to semestre.

En base a la pregunta de ansiedad somática, el primer lugar lo ocupa con el (70.6%) 1er semestre con ausencia de padecimiento alguno de ellos, y en un menor porcentaje (26.5%) suele presentar signos de ansiedad, pertenecientes a 5to semestre.

Además con síntomas somáticos generales hubo un (64.7%) que supera a un (23.5%) , siendo el 1er semestre con ausencia de este y el de mayor porcentaje con respecto a 3ro.

Los síntomas genitales, como disminución del libido y trastornos mentales un (94.1%) de 1er semestre esta ausente, la mayoría no tiene problemas generales de este.

En hipocondría, nuevamente 1er semestre ocupa el primer lugar estando y persistiendo con ausencia y con porcentaje de (82.4%).

La pérdida de peso es notorio que estadísticamente el (88.2%) de la mayoría pierde 500 gr en una semana, que corresponde a 1er semestre.


Finalmente, la perspicacia con (52.9%) no se había dado cuenta de tener la enfermedad, es decir, todos los chicos de 5to semestre.

Los de 1er semestre no tienen muchos síntomas prevalecientes, por ende, la mayor parte está en estado normal, según los valores estimados de la escala. Y en 5to hay menos que depresión menor, de modo que 3ro si tiene depresión menor, eso con lo visto en la gráfica.

ESCALA DE DEPRESIÓN HAMILTON

NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS


Distribución de las puntuaciones totales



EDADES

¿Qué edad tienes?


17 respuestas



SEXO

Género

17 respuestas




- Masculino
- Femenino

LICENCIATURA

Licenciatura


17 respuestas



- Medicina Humana
- Medicina Veterinaria
- Enfermería
- Nutrición

SEMESTRE






Semestre
17 respuestas



- 1er semestre
- 3er semestre
- 5to semestre
- 7to semestre

CUESTIONARIO VALORES


Puntuación	Gravedad del cuadro
0-7	Estado normal
8-12	Depresión menor
13-17	Menos que depresión mayor
18-29	Depresión mayor
30-52	Más que depresión mayor

	Valores
	0
	1
	2
	3
	4

PREGUNTAS

Humor deprimido, tristeza (melancolía) desesperanza, desamparo, inutilidad


17 respuestas



- Ausente
- Expreso estas sensaciones solo si me preguntan
- Relato estas sensaciones espontáneamente
- Manifiesto estas sensaciones en comunicación verbal y no verbal de forma espontanea

Sentimiento de culpa


17 respuestas



- Ausente
- Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente
- Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre los errores del pasado o malas acciones
- Siente que su estado actual es un castigo
- Oye voces acusatorias o de castigo o de denuncia y/o experimenta alucinacion...

Suicidio


17 respuestas



- Ausente
- Le parece que la vida no vale la pena ser vivida
- Desearía estar muerto o tiene pensamientos de la posibilidad de morir
- Ideas de suicidio

Insomnio precoz


17 respuestas



- No hay dificultad
- Dificultad ocasional para dormir, le toma más de media hora conciliar el sueño
- Dificultad para dormir cada noche

Insomnio intermedio


17 respuestas



- No hay dificultad
- Esta desvelado o inquieto o se despierta varias veces durante la noche de forma espontanea
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión para levantarse de la cama (excepto por motivos de evacuar)

Insomnio tardío


17 respuestas



- No hay dificultad
- Se despierta a primeras horas de la noche pero se vuelve a dormir
- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama

Trabajo y actividades


17 respuestas



- No hay dificultad
- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos)
- Pérdida de interés en su actividad (discapacidad de la atención, indecisi...
- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o discapacidad de la pro...
- Dejar de trabajar, solo se compromete en pequeñas tareas o no puede realiz...


Inhibición psicomotora (lentitud del pensamiento y palabra, facultad de concentración disminuida, disminución de la actividad motora)

17 respuestas



Agitación motora


17 respuestas



- Ninguna
- Juega con sus dedos
- No puede mantenerse quieto ni sentado
- Retuerce las manos, se muerde las uñas o los labios, se tira de los cabellos

Ansiedad psíquica


17 respuestas



- No hay dificultad
- Tensión subjetiva e irritable
- Preocupación por pequeñas cosas
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla
- Expresa sus temores sin que le pregunten


Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad tales como: gastrointestinales: sequedad de la boca, diarrea, eructos etc. cardiovasculares: palpi...recuencia de micción incrementada. Transpiración)

17 respuestas



Síntomas somáticos generales


17 respuestas



- Ninguno
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas. Algas musculares. Pérdida de energía o fatigabilidad
- Cualquiera de los síntomas bien definidos


Síntomas genitales (disminución del libido y trastornos mentales)

17 respuestas



Hipocondría


17 respuestas



- Ausente
- Preocupado por sí mismo (corporalmente)
- Preocupado por su salud
- Se lamenta constantemente, solicita ayuda

Pérdida de peso


17 respuestas



- Pérdida inferior a 500 gr en una semana
- Pérdida de peso de más de 500 gr en una semana
- Pérdida de más de 1kg en una semana

Perspicacia

17 respuestas



- Se da cuenta de que esta deprimido y enfermo
- Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso etc.
- No se había dado cuenta de su enfermedad