



Nombre del Alumno Renatha Concepcion Barredo Robledo

Nombre del tema Tarea de plataforma "Cuadro Comparativo"

Parcial 3er parcial

Nombre de la Materia Psicología Medica

Nombre del profesor Dr. Edwin Yoani Lopez Montes

Nombre de la Licenciatura Medicina Humana

Cuatrimestre 1er semestre

Cuadro comparativo

Cuadro Comparativo

| CONCEPTO | FACTORES DE RIESGO | TAMIZAJE | FARMACO | CUADRO CLINICO | DIAGNOSTICO | |
|------------------------------------|---|---|------------------|---|---|--|
| Trastorno Depresivo Mayor | Es un trastorno del estado que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades | No modificables: edad, intento de suicidio, antecedentes de suicidio. Modificables: ideas suicidas, actitudes, desesperanza, impulsividad, estrés | CIE-10 y DMS-5 | Fluoxetina - sertralina - paroxetina. | 7-12 Años. Afectiva, Irritabilidad, Tristeza, Ideas de muerte. Adherentes, mismos síntomas que en la edad prepuberal. | Cuadro clínico compatible con depresión. Duración de síntomas al menos dos semanas, síntomas presentes en uno o más días |
| Ansiedad en El adulto MAYOR | Se caracteriza por la angustia y preocupación excesiva y están asociados a 3 síntomas por 6 meses: Irritabilidad, tensión muscular y inquietud. | Viajar solo, Viudo o divorciado y la enfermedad pulmonar se prevalece de hasta 44% y diabetes mellitus tipo 2 con 56% | DSM-5 | Taquicardia, temblor, Hiperactividad Opresión de pecho etc. | Hiperactividad Habla apresurada Miedo - Temblor etc. | Síntomas físicos en su mayoría. angustia discapacidad - psicológicas conductuales |
| Depresión Postparto | Un episodio de depresión mayor que es asociado temporalmente al parto con el sentimiento de tristeza insomnio o hipersomnio | Depresión anteriormente intentos de suicidio previos antecedentes de suicidio - Familiares, Violencia intra-familia. | BECK | Sertralina pero también se recomiendan fluoxetina paroxetina y citalopram | ansiedad Irritación Tristeza llanto | Sentimiento de tristeza Sensación de indiferencia o Placer - pérdida de apetito Insomnio - hipersomnio etc. |
| Deficit De Atención e Impulsividad | Trastorno del neurodesarrollo por inatención e hiperactividad e impulsividad | La genética, medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo | ESCALA DE CONNER | Metilfenolato de liberación inmediata | Hiperactividad, impulsividad. Patrón persistente de conductas en niños, movimientos - impulsivos. | Presentan Hiperactividad impulsividad, alteraciones de aprendizaje deficit de Atención. |