



GRAFICAS DE ESCALAS DE CUESTIONARIOS DE BECK Y HAMILTON




ESCALA DE DEPRESIÓN HAMILTON

NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS


Distribución de las puntuaciones totales




EDADES




SEXO



LICENCIATURA



SEMESTRE



CUESTIONARIO VALORES


Puntuación	Gravedad del cuadro
0-7	Estado normal
8-12	Depresión menor
13-17	Menos que depresión mayor
18-29	Depresión mayor
30-52	Más que depresión mayor

	Valores
	0
	1
	2
	3
	4

PREGUNTAS


Humor deprimido, tristeza (melancolía) desesperanza, desamparo, inutilidad

17 respuestas



Sentimiento de culpa

17 respuestas




Suicidio

17 respuestas




Insomnio precoz

17 respuestas



Insomnio intermedio


17 respuestas



- No hay dificultad
- Esta desvelado o inquieto o se despierta varias veces durante la noche de forma espontanea
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión para levantarse de la cama (excepto por motivos de evacuar)

Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad tales como: gastrointestinales: sequedad de la boca, diarrea, eructos etc. cardiovasculares: palpi...recuencia de micción incrementada. Transpiración)


17 respuestas



- Ausente
- Ligera
- Moderada
- Severa
- Incapacitante

Síntomas somáticos generales


17 respuestas



- Ninguno
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas. Algias musculares. Pérdida de energía o fatigabilidad
- Cualquiera de los síntomas bien definidos

Síntomas genitales (disminución del libido y trastornos mentales)


17 respuestas



- Ausente
- Débil
- Grave

Hipocondría


17 respuestas



- Ausente
- Preocupado por sí mismo (corporalmente)
- Preocupado por su salud
- Se lamenta constantemente, solicita ayuda

Inhibición psicomotora (lentitud del pensamiento y palabra, facultad de concentración disminuida, disminución de la actividad motora)


17 respuestas



- Palabra y pensamientos normales
- Ligero retraso en el habla
- Evidente retraso en el habla
- Dificultad para expresarse
- Incapacidad para expresarse

Agitación motora


17 respuestas



- Ninguna
- Juega con sus dedos
- No puede mantenerse quieto ni sentado
- Retuerce las manos, se muerde las uñas o los labios, se tira de los cabellos

Ansiedad psíquica


17 respuestas



- No hay dificultad
- Tensión subjetiva e irritable
- Preocupación por pequeñas cosas
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla
- Expresa sus temores sin que le pregunten

Pérdida de peso


17 respuestas



- Pérdida inferior a 500 gr en una semana
- Pérdida de peso de más de 500 gr en una semana
- Pérdida de más de 1kg en una semana

Perspicacia


17 respuestas



- Se da cuenta de que esta deprimido y enfermo
- Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso etc.
- No se había dado cuenta de su enfermedad

Insomnio intermedio


17 respuestas



- No hay dificultad
- Esta desvelado o inquieto o se despierta varias veces durante la noche de forma espontanea
- Esta despierto durante la noche, cualquier ocasión para levantarse de la cama (excepto por motivos de evacuar)

Insomnio tardío


17 respuestas



- No hay dificultad
- Se despierta a primeras horas de la noche pero se vuelve a dormir
- No puede volver a dormirse si se levanta de la cama

INVENTARIO DE BECK


NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON



EDADES DE ENCUESTADOS


Edad (Ejem: 18,19..)

13 respuestas




SEXO

Sexo:
13 respuestas



SEMESTRE

Semestre
13 respuestas



LICENCIATURA

Licenciatura(carrera):
13 respuestas



CUESTIONARIO

