



Nombre del Alumno Renatha Concepcion Barredo Robledo

Nombre del tema Tarea de plataforma "Cuadro Comparativo"

Parcial 3er parcial

Nombre de la Materia Psicología Medica

Nombre del profesor Dr. Edwin Yoani Lopez Montes

Nombre de la Licenciatura Medicina Humana

Cuatrimestre 1er semestre

Cuadro comparativo

	CONCEPTO	FACTORES DE RIESGO	DIAGNOSTICO	CUADRO CLINICO	TAMIZ	
↓	TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR	Es un trastorno del estado que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades	No modificables: edad, intento de suicidio, antecedentes de suicidio Modificables: ideas suicidas activas, desesperanza, impulsividad, estrés	CIE-10 Y DMS-5	Se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Además, puede alterar el sueño y el apetito, y es frecuente que concorra con cansancio y falta de concentración.	PHQ-9 EN ADULTOS ,BECK (13 AÑOS)
	ANSIEDAD EN EL ADULTO MAYOR	se caracteriza por la angustia y preocupación excesiva y están asociadas a 3 síntomas por 6 meses: irritabilidad, tensión muscular y intranquilidad	Viajar solo, viudo o divorciado y la enfermedad pulmonar se prevalencia de hasta 44% y diabetes mellitus tipo 2 con 56%	DSM-5	Taquicardia, hiperbentilacion, precios de pecho , temblor , sensación de ahogo, hiperactividad, habla apresurada , miedo , etc	GAI y GAI -SF
	DEPRESION POSTPARTO	Un episodio de depresión mayor que es asociado temporalmente al parto con el sentimiento de tristeza, insomnio o hipersomnia	Depresión anteriormente, intentos de suicidio previos, antecedentes de suicidios familiares, violencia intrafamiliar	CIE -10	Ansiedad, irritación, tristeza, llanto sin precedentes ,disminución o pérdida del apetito, desatención de actividades importantes y pensamientos de muerte , insomnio , hipersomnia ,	Escala de edimburgo
	DEFICIT DE ATENCION E IMPERACTIVIDAD	Trastorno del neurodesarrollo por inatención e imperactividad e impulsividad	La genética, medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo	CIE-10	Hiperactividad, impulsividad, patrón persistentes de conductas en niñez , movimientos impulsivos, incapacidad de terminar una tarea asignada, agresividad , conducta desafiante	CONNER