



Nombre del alumno: Johana Alejandra Muñoz Lay

Nombre del tema: cuadro comparativo de periodo crecimiento posnatal

Primer parcial GrupoB

Materia: Crecimiento y desarrollo

Nombre del docente: Dra. Malleli Yazmin Laparra López

Medicina humana

Tercer Semestre

Lugar: huehuetan chiapas

Fecha: 17/09/2023

PERIODO POSNATAL

ETAPA LACTANTE

- La valoración del crecimiento y desarrollo se debe hacer cada mes en el primer año.
- El crecimiento del tejido neural y su desarrollo ocupan el primer lugar en velocidad e importancia.
- En estos dos años aumenta cuatro veces el peso de nacimiento, de 3 a 12 kg.
- El perímetro cefálico pasa de 35 a 48.5 cm.
- La talla crece en 72%, de 50 a 86 cm.
- Se incrementan las capacidades de percepción y funcionalidad, así como la esfera neuromotora.

ETAPA PREESCOLAR

- Comprende de los 2 a 6 años.
- Hay desaceleración de la velocidad de crecimiento (comparado con el lactante). Crece 6 cm y aumenta 2 kg por año.
- La configuración somática cambia al tipo longilíneo.
- Los requerimientos energéticos disminuyen en relación a las etapas anteriores.
- Etapa de los "por qué" y de los "nos".
- Identificación de su sexo. Etapa fálica.
- Adquisición de esquemas de conducta. Perfeccionamiento de aptitudes psicomotoras. Inicia su capacitación para el aprendizaje escolar.
- Cobran importancia los accidentes, intoxicaciones, quemaduras. Surgen los padecimientos neoplásicos y mieloproliferativos.

ETAPA ESCOLAR

- Comprende los seis a 12 años en el niño y los seis a 10 años en la niña.
- El peso aumenta 3 a 3.5 kg por año.
- Empieza a predominar el segmento inferior sobre el superior.
- Se atenúan las curvaturas de la columna.
- El tejido linfóide ocupa el primer lugar en la velocidad del crecimiento.
- Identifica su rol de género.
- Su pensamiento pasa de ser abstracto a ser concreto (ordenar y relacionar secuencias lógicas), más científico que mágico, más deductivo que inductivo.

ETAPA DE ADOLESCENCIA

- Etapa que define el límite entre la infancia y la adultez debido a la serie de cambios físicos, hormonales, psico-lógicos y sociales.
- Su inicio no está bien definido, pero se sucede dos años antes en la mujer, y termina dos años antes para el varón.
- En forma práctica presenta tres etapas o períodos: temprana-media-tardía, con peculiaridades biológicas, psicológicas y sociales que las particularizan.
- La aparición y desarrollo de caracteres sexuales secundarios sigue una secuencia fija. El tiempo de presentarse es variable.
- La primera manifestación en la adolescente, es la ingurgitación mamaria. En el varón es el crecimiento testicular.
- El área psicológica emotiva tiene cambios y reestructuración. El pensamiento ahora es abstracto y creativo y, al final, se consolida como un sujeto apto para dirigirse en el ámbito biopsicosocial y su entorno.

Bibliografía

Martínez, R. (2017). Salud y enfermedad del niño y del adolescente. Editorial El Manual Moderno.