



Mi Universidad



ALUMNO:

UZIEL DOMINGUEZ ALVAREZ

DOCENTE:

DRA. MAYELLI YASMIN LAPARRA LOPEZ

ASIGNATURA:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO



ACTIVIDAD:

INFOGRAFIA

CARRERA:

MEDICINA HUMANA



UNIVERSIDAD:

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



LUGAR Y FECHA:

TAPACHULA CHIAPAS A 08/12/23



ACCIDENTES

Elaborado por: Uziel Domínguez Alvarez

1

DEFINICIÓN

Un accidente se refiere a un suceso imprevisto, inesperado y indeseable que puede causar daños a las personas, equipos o instalaciones, y puede ser causado por factores como la falta de seguridad, ergonomía, psicosociales y condiciones de tráfico



CAUSA ACCIDENTES



FACTORES ASOCIADOS

2

- Estrés laboral
- Turno nocturno
- Uso inadecuado o insuficiente de equipo
- Condiciones ergonómicas
- Condiciones psicosociales
- Falta de espacio, limpieza o desorden
- Terreno con zanjas, taludes o desniveles
- Causas relacionadas con el tráfico

3

ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN

se refiere a la ocurrencia de accidentes en la circulación de vehículos y personas en el entorno de los lugares de trabajo. Estos accidentes pueden ser causados por factores como la falta de espacio, limpieza o desorden, y las condiciones de tráfico



MEDIDAS PREVENTIVAS

4

- Uso de puertas o escotillas que abran por dentro
- Contar con iluminación adecuada en las áreas de trabajo
- Mantener las zonas de paso, salidas y vías de circulación libres de obstáculos
- Realizar inspecciones periódicas de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.



5

IMPORTANCIA

Identificar y abordar los factores de riesgo y las causas de accidentes en el trabajo y en la circulación para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores y reducir la prevalencia de accidentes.




EDAS

Elaborado por: Uziel Domínguez Alvarez

1

DEFINICIÓN

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es una enfermedad infecciosa producida por virus, bacterias, hongos o parásitos, que afecta principalmente a niñas y niños menores de cinco años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la EDA como la presencia de heces asociada a un aumento de la frecuencia (al menos 3 en 24 horas) que puede ir acompañada de vómito y/o fiebre, y la duración del episodio debe ser menor de 14 días.



ETIOLOGIA

2

- Los principales etiologos de la EDA incluyen:
- Rotavirus
- Bacteria Escherichia coli
- Parásitos

3

PREVENCIÓN

- Acceso a fuentes inocuas de agua de consumo
- Uso de servicios de saneamiento mejorados
- Lavado de manos con jabón
- Lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida
- Higiene personal y alimentaria adecuadas



DIAGNOSTICO

4

- Calprotectina fecal: restringido para casos con sospecha de enfermedad infecciosa
- Coprocultivos: Se recomienda realizarlos en casos de diarrea persistente o recurrente

5

TRATAMIENTO

- Reposo
- Hidratación oral con agua y/o Vida Suero Oral
- Control de la diarrea y deshidratación
- Uso de medicamentos antidiarreicos, como el Vida Suero Oral, según indicación médica



IRAS

Elaborado por: Uziel Domínguez Álvarez

1

DEFINICIÓN

La infección respiratoria aguda (IRA) es un proceso infeccioso que afecta cualquier área de las vías respiratorias, pudiendo comprometer la nariz, oídos, faringe, epiglotis, tráquea, bronquios y pulmones. Estas infecciones son generalmente autolimitadas y no suelen requerir antibióticos, ya que la mayoría de los casos son causados por virus.



ETIOLOGIA

2

La infección respiratoria aguda (IRA) es un proceso infeccioso que afecta cualquier área de las vías respiratorias, pudiendo comprometer la nariz, oídos, faringe, epiglotis, tráquea, bronquios y pulmones. Estas infecciones son generalmente autolimitadas y no suelen requerir antibióticos, ya que la mayoría de los casos son causados por virus.

3

PREVENCIÓN

Algunas medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas incluyen:

- Aumentar la ingesta de líquidos.
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Evitar frotarse los ojos.



DIAGNOSTICO

4

El diagnóstico de la IRA se realiza principalmente a través de la evaluación clínica de los síntomas presentes en el paciente, como tos, fiebre, congestión nasal, entre otros.

5

TRATAMIENTOS

El tratamiento de la IRA se centra en aliviar los síntomas y puede incluir:

- Reposo.
- Hidratación adecuada.
- Uso de medicamentos para el alivio de la tos y la fiebre, según indicación médica.





REFERENCIA:

- [/https://docs.bvsalud.org/bibliorev/2021/05/1222412/42-55.pdf](https://docs.bvsalud.org/bibliorev/2021/05/1222412/42-55.pdf)
- <https://www.elsevier.es/es-revista-pediatria-213-articulo-guia-practica-clinica-enfermedad-diarreica-S0120491215000075>
- <https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/GPC%20IRA%20MENORES%205%20anios.pdf>

