

Abdomen agudo

Clinicas Quirúrgicas
José Francisco Pérez Pérez

7

24 10 23

Scribble

- 1.- ¿Cuál es la definición de abdomen agudo?
- Dolor abdominal de inicio repentino y signos de irritación peritoneal
 - Dolor abdominal de inicio gradual + signos de irritación peritoneal
 - Dolor abdominal de inicio repentino y signos de irritación peritoneal, pero sin signos de peritonitis
 - Dolor abdominal de inicio gradual + signos de irritación peritoneal, pero sin signos de peritonitis

- 2.- ¿Cuáles son las causas intraabdominales más comunes de abdomen agudo?
- Apendicitis aguda, obstrucción intestinal y perforación de visceras huecas
 - Pancreatitis aguda, colecistitis aguda y diverticulitis aguda
 - Infarto intestinal, hemorragia intraabdominal e infección urinaria
 - Infarto agudo de miocardio, aneurisma de aorta abdominal y embarazo ectópico

- 3.- ¿Cuáles son los síntomas más comunes del abdomen agudo?
- Dolor abdominal, náuseas + vómitos, diarrea o estreñimiento, fiebre y alteración del estado general
 - Dolor abdominal, náuseas + vómitos, diarrea o estreñimiento, fiebre + alteración del estado mental
 - Dolor abdominal, náuseas + vómitos, diarrea o estreñimiento, fiebre y alteración del pulso
 - Dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea o estreñimiento, fiebre + alteración de la presión arterial,

PERITONITIS

30

Scribe

1.- ¿Cuál de los siguientes es una causa de peritonitis primaria?

✓ L° Apendicitis x

• Coleristitis

• Úlcera péptica perforada

→ • Todas las anteriores

2.- ¿Cuál de los siguientes es una causa de peritonitis secundaria?

✓ L° Infección de la cavidad peritoneal por bacterias

• Infección de la cavidad peritoneal por hongos

• Infección de la cavidad peritoneal por virus

• Todas las anteriores

3.- ¿Cuál de los siguientes es una causa de peritonitis terciaria?

• Infección de la cavidad peritoneal por bacterias resistentes a los antibióticos

• Infección de la cavidad peritoneal por hongos resistentes a los medicamentos antifúngicos

→ • Infección de la cavidad peritoneal por virus resistentes a los medicamentos antivirales

x L° Todas las anteriores

4.- ¿Cuál de los siguientes es un signo clínico de peritonitis?

• Dolor abdominal

• Fiebre

• Rigidez abdominal

✓ L° Todas las anteriores

ABSCEOS INTRAABDOMINALES Y HEPATICOS

103

D	M	A
---	---	---

Scribe

1.- ¿Cuál es la causa más común de abscesos intraabdominales?

- ✓ A - Apendicitis perforada
- B - Colitis ulcerosa
- C - Diverticulitis
- D - Pankreatitis
- E - Peritonitis

2.- ¿Cuál es el signo más común de un absceso intraabdominal?

- ✓ A - Dolor abdominal
- B - Fiebre
- C - Náuseas y vómitos
- D - Diarrea
- E - Pérdida de peso

3.- ¿Cuál es el tratamiento más común para los abscesos intraabdominales?

- A - Antibióticos
- ✓ B - Drenaje quirúrgico
- C - Cirugía laparoscópica
- D - Cirugía abierta

4.- ¿Cuál es la causa más común de abscesos hepáticos?

- ✓ A - Infecciones bacterianas
- B - Infecciones fúngicas
- C - Infecciones virales
- D - Trauma
- E - Enfermedad de Wilson

5.- ¿Cuál es el signo más común de un absceso hepático?

- ✓ A - Dolor abdominal
- B - Fiebre
- C - Náuseas y vómitos
- D - Diarrea
- E - Pérdida de peso

6.- ¿Cuál es el tratamiento más común para los abscesos hepáticos?

APENDICITIS AGUDA

8B

1.- ¿Cuál es el síntoma más común de la apendicitis aguda?

- ✓ - A) Dolor abdominal
- B) Náusea y vómito
- C) Fiebre
- D) Diarrea

2.- ¿Cuál es la localización típica del dolor abdominal en la apendicitis aguda?

- A) Periumbilical
- B) Cuadrante inferior derecho
- C) Cuadrante superior izquierdo
- D) Epigástrico

3.- ¿Cuál es el signo físico más específico de la apendicitis aguda?

- A) Defensa muscular
- B) Dolor a la palpación
- C) Blumberg sign
- D) Rousing sign

4.- ¿Cuál es el tratamiento de elección para la apendicitis aguda?

- A) Antibióticos
- B) Cirugía
- C) Reposo en cama
- D) Dieta líquida

5.- ¿Cuál es la complicación más temida de la apendicitis aguda?

- A) Peritonitis
- B) Absceso apendicular
- C) Ruptura apendicular
- D) Infección del intestino

6.- ¿Cuál es el grupo de edad más afectado por la apendicitis aguda?

- A) Niños
- B) Adolescentes
- C) Adultos jóvenes
- D) Adultos mayores