

"Abdomen Agudo"

8

✓ 1: ¿Cuál es la definición de abdomen agudo?

✓ Lº Dolor abdominal de inicio repentino y signos de irritación peritoneal

• " " " " gradual " " "

• " " " " repentina, pero

sin signos de peritonitis.

• Dolor abdominal de inicio gradual y signos de irritación peritoneal, pero sin signos de peritonitis

✓ 2: ¿Cuáles son las causas intraabdominales más comunes de abdomen agudo?

✓ Lº Apendicitis aguda, obstrucción intestinal y perforación de visera hueca.

• Pancreatitis aguda, coleitis aguda y diverticulitis aguda

• Infarto intestinal, hemorragia intrabdominal, e infección urinaria.

• IAM, aneurisma de aorta abdominal y embarazo ectópico.

✓ 3: ¿Cuáles son los síntomas más comunes del abdomen agudo?

✓ Lº Dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea o estreñimiento, fiebre y alteración del estado general.

• Dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, alt. estado mental

• Dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, alt. del pulso

• Dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, alt. presión arterial.

✓ 4: ¿Cuál es el signo físico más característico del abdomen agudo?

• Dolor abdominal localizado o generalizado

• Defensa abdominal

✓ Lº Signos de irritación peritoneal

✗ Lº Todos los anteriores.

✓ 5: ¿Qué pruebas complementarias se pueden realizar para diagnóstico?

✓ Lº Rx de abdomen, ultrasonografía y tomografía computarizada

• Rx de tórax, EKG y análisis de sangre

• Prueba de imagen, labs y funcionales

✗ Lº Todas las anteriores.

Peritonitis

B

1. ¿Cuál es la causa de peritonitis primaria?

- Apendicitis
- Colecistitis
- Ulcera péptica perforada
- Todos los anteriores

2. ¿Cuál es una causa de peritonitis secundaria?

- Infección de la cavidad peritoneal por bacterias
- " " " " hongos
- " " " " virus

Todos los anteriores

3. ¿Cuál es una causa de peritonitis terciaria?

- Infección de cavidad peritoneal por bacterias resistentes a los antibióticos
- " " " " hongos
- " " " " virus

Todos los anteriores

4. ¿Cuál de los siguientes es un signo clínico de peritonitis?

- Dolor abdominal
- Fiebre
- Rígidez abdominal

Todos los anteriores

5. ¿Cuál de los siguientes es un signo de peritonitis?

- Aumento de grosor del peritoneo
- Edema de la pared abdominal
- Presencia de líquido libre en cavidad peritoneal

Todos los anteriores

6. ¿Cuál es un tratamiento para peritonitis primaria?

- Antibióticos
- Cirugía

"Apendicitis"

1: ¿Cuál es el síntoma más común de la apendicitis aguda?

- (a) Dolor abdominal
- (b) Náusea y vómito
- (c) Fiebre
- (d) Diarrea

2: ¿Cuál es la localización típica del dolor abdominal en apendicitis aguda?

- (a) Perumbilical
- (b) Cuadrante inferior derecho
- (c) " superior izquierdo
- (d) Epigastrio

3: ¿Cuál es el signo físico más específico de apendicitis aguda?

- (a) Defensa muscular
- (b) Dolor a la palpación
- (c) Blumberg sign
- (d) Rovsing sign

4: ¿Cuál es el fx de elección para apendicitis aguda?

- (a) Antibióticos
- (b) Cirugía
- (c) Reposo en cama
- (d) Dieta líquida

5: ¿Cuál es la complicación más temida de apendicitis aguda?

- (a) Peritonitis
- (b) Abscesos apendiculares
- (c) Ruptura apendicular
- (d) Inflamación del intestino delgado

6: ¿Cuál es el grupo de edad más afectado por apendicitis aguda?

"Abscesos intraabdominales"

1: ¿Cuál es la causa más común de abscesos intraabdominales?

- (A) Apendicitis Perforada ✓
- (B) Colitis ulcerosa
- (C) Diverticulitis
- (D) Peritonitis

2: ¿Cuál es el signo más común de un absceso intraabdominal?

- (A) Dolor abdominal ✗
- (B) Fiebre ✓
- (C) Náuseas y vómitos
- (D) Diarrea

3: ¿Cuál es el tx más común para abscesos intraabdominales?

- (A) Antibióticos
- (B) Drenaje Qx ✓
- (C) Cirugía laparoscópica
- (D) Cirugía abierta

4: ¿Cuál es la causa más común de abscesos hepáticos?

- (A) Infecciones bacterianas ✗
- (B) " fúngicas ✓
- (C) " virales
- (D) Trauma
- (E) Enfermedad de Wilson

5: ¿Cuál es el signo más común de un absceso hepático?

- (A) Dolor abdominal
- (B) Fiebre
- (C) Náuseas
- (D) Diarrea