


¿Cuál es el tipo de tumor gástrico más frecuente?

- Adenocarcinoma ✓
- Linfoma
- Tumor carcinoide
- Leiomiocarcinoma



¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer gástrico?

- Infección por *Helicobacter pylori* ✓
- Tabaquismo
- Obesidad

Dieta alta en sal

¿Cuáles son los síntomas más comunes del cáncer gástrico?

- Pérdida de peso
- Dolor abdominal Todos ✓
- Náuseas y vómito
- Sangrado gástrico intestinal

¿Cuál es el método de diagnóstico más preciso para el cáncer gástrico?

- Endoscopia con biopsia ✓
- Tomografía computarizada
- Ecografía
- Resonancia magnética

¿Cuál es el tratamiento estándar para el cáncer gástrico?

- Cirugía ✓
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Combinación de los anteriores

¿Cuál es la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer gástrico avanzado?

- Más del 90%
- Entre el 60 y 70% ✓
- Entre el 30 y 40% x
- Menos del 20%




procedimiento quirúrgico estándar para tratar la colitis ulcerosa es una:

proctocolectomía ✓

Resección colónica  
Anastomosis ileoanal  
Hemorrroidectomía.

proctocolectomía es un procedimiento quirúrgico que extirpa:



El colon y recto ✓

El colon solo x

El recto solo

El colon, el recto y el ano

proctocolectomía se realiza cuando la colitis ulcerosa:

No responde al tratamiento médico

Causa complicaciones graves

Es una enfermedad terminal

Todas las anteriores ✓

complicaciones de la proctocolectomía puede incluir:

Infección

Sangrado

Obstrucción intestinal

Todas las anteriores ✓

paciente que se somete a una proctocolectomía deberá recibir:

Tratamiento médico para controlar inflamación

Una bolsa de ostomía

Ambas respuestas son correctas. ✓

cirugía es una opción de tratamiento para la enfermedad de Crohn en los siguientes casos:

Cuando la enfermedad no responde al tratamiento médico

Cuando la enfermedad causa complicaciones graves, como obstrucción intestinal o p

Cuando la enfermedad se extiende a otros órganos

Todas las anteriores. ✓