



**Mi Universidad**

Sem Benjamin Vazquez Ibarias

Triada de la enfermedad

Antropologia Medica

Dra. Iris Mayela Toledo Lopez


Licenciatura en Medicina Humana

semestre I

# salmonella

salmonelosis

SER HUMANO



- Actividades que pueden ponerte en contacto con la bacteria de la salmonela
- Trastornos del intestino o el estómago
- Problemas inmunológicos

C  
U  
A  
D  
R  
O  
  
C  
L  
I  
N  
I  
C  
O

## CUADRO CLINICO

- Diarrea
- Cólicos estomacales (abdominales)
- Fiebre
- Náuseas
- Vómitos
- Escalofríos
- Dolor de cabeza
- Sangre en las heces

## PERIODO PREPATOGENICO

- Lavarse bien las manos puede ayudar a prevenir la transferencia en la boca o en cualquier alimento que se está preparando
- Mantener las cosas separadas para evitar la contaminación cruzada: guardar la carne cruda, aves y mariscos lejos de otros alimentos en su refrigerador,
- No colocar alimentos cocidos en un plato sin lavar donde había carne cruda.
- Es necesario que la carne de aves, de bovino y huevos probablemente infectados, se cocinen con cuidado.

## PERIODO PATOGENICO

DX


- Coprocultivo

TX

Ciprofloxacino 500 cada 12 horas por 7 días.  
Azitromicina 500 mg cada 24 horas por 3 a 5 días.  
Ceftriaxona 1 g cada 24 horas por 7 días.

# NEUMONIA

- **Streptococcus pneumoniae**  
**Pseudomonas aeruginosa,**  
**Haemophilus influenzae,**  
**Staphylococcus aureus.**



SER HUMANO

- Edad mayor de 65 años
- Tabaquismo
- EPOC
- Tratamiento con esteroides

C  
U  
A  
D  
R  
O  
  
C  
L  
I  
N  
I  
C  
O

## CUADRO CLINICO

- Dolor en el pecho al respirar o toser
- Desorientación o cambios de percepción mental (en adultos de 65 años o más)
- Tos que puede producir flema
- Fatiga
- Fiebre, transpiración y escalofríos con temblor
- Náuseas, vómitos o diarrea
- Dificultad para respirar

## PERIODO PREPATOGENICO

## PERIODO PATOGENICO

Se recomienda utilizar las vacunas de polisacáridos de pneumococo para prevenir la enfermedad por pneumococo invasiva en adultos sanos; no se recomienda su uso en niños ya que en este grupo de edad es pobremente inmunogénica.

## DIAGNOSTICO


- Radiografía torácica
- Prueba de esputo

## TRATAMIENTO

Amoxicilina  
ceftriaxona

# ENDOCARDITIS

Staphylococcus aureus



SER HUMANO

- INFECCIONES DE ORGANOS INTERNOS
- SUSTANCIAS INTRAVENOSAS
- DEFECTOS CARDIACOS

C  
U  
A  
D  
R  
O  
  
C  
L  
I  
N  
I  
C  
O

- Dolor en las articulaciones y los músculos.
- Dolor en el pecho cuando respiras.
- Fatiga.
- Síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y escalofríos.
- Sudoraciones nocturnas.
- Falta de aire.
- Hinchazón en los pies, las piernas o el vientre.
- Un sonido sibilante nuevo o modificado en el corazón (soplo)

## PERIODO PREPATOGENICO

## PERIODO PATOGENICO

- Evitar procedimientos no estériles que puedan provocar infecciones.
- Se pueden administrar antibióticos preventivos a pacientes de alto riesgo como pacientes con válvulas dañadas

### DX

- Hemocultivo
- Hemograma completo:
- Ecocardiograma
- Electrocardiograma (ECG).
- Radiografía de tórax.

### TX

Penicilina  
Vancomicina

# **BIBLIOGRAFIA**

GUIAS PRACTICAS CLINICAS