



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura

Medicina Humana

Materia

Nutrición

Docente

Dra. Iris Mayela Toledo López

Trabajo

Cuadro comparativo de las patologías

Estudiante

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo

3 semestre

Grupo "B"

Parcial 1

Tapachula, Chiapas

11 de septiembre de 2023

Fuentes consultadas para la realización del cuadro comparativo.

1. https://www.sefac.org/system/files/2021-10/Monografia%20ERGE_13as.pdf
2. <http://www.revistagastroenterologiamexico.org/es-diagnostico-tratamiento-enfermedad-por-reflujo-articulo-S0375090616300350>
3. <https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/ulcerative-colitis>
4. <https://medlineplus.gov/spanish/irritablebowelsyndrome.html>
5. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000206.htm>

CUADRO COMPARATIVO

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Universidad del Sureste

PATOLOGIAS	ERGE	COLITIS ULCEROSA	SX COLON IRRITABLE	ÚLCERA
DEFINICIÓN	La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago. El espectro clínico de la ERGE es muy variado, ya que la presencia de síntomas, la existencia de lesiones.	La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que causa inflamación y úlceras en el revestimiento del colon y el recto.	Es un trastorno gastrointestinal que afecta al intestino grueso. Pero los más comunes son dolor abdominal, distensión abdominal, cambios en los hábitos intestinales, gases y llenura.	Una úlcera es una lesión en la mucosa que recubre el estómago o el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado.
MANIFESTACIÓN CLÍNICA	sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, acidez gástrica o dolor urente en el pecho, náuseas después de comer. Los síntomas menos comunes son: devolver el alimento (regurgitación), tos o sibilancias	Diarrea, a menudo con sangre o pus, dolor abdominal y calambres, dolor rectal, urgencia para defecar, incapacidad para defecar a pesar de la urgencia, pérdida de peso, fatiga, fiebre.	Algunas personas con SCI tienen estreñimiento, mientras que otras tienen diarrea.	La causa más común de úlceras es una infección del estómago por la bacteria llamada Helicobacter pylori (H. pylori). dolor abdominal, distensión abdominal, cambios en los hábitos intestinales, gases y llenura
DIAGNOSTICO	Si los síntomas no mejoran con los cambios en el estilo de vida y los medicamentos, es posible que el paciente necesite que le hagan unas pruebas	Se diagnostica mediante una combinación de pruebas, incluyendo un examen físico, análisis de sangre y heces, colonoscopia y biopsia.	se realiza mediante la revisión de los síntomas y la historia clínica del paciente y practicarle un estudio llamado sigmoidoscopia o colonoscopia.	Se realiza mediante la revisión de los síntomas y la historia clínica del paciente, y se pueden hacer otros exámenes para descartar otros problemas.
TRATAMIENTO	Los médicos podrían recomendar cambios en el estilo de vida, medicamentos, cirugía o una combinación de estos tratamientos.	El uso de medicamentos antiinflamatorios, como los corticosteroides y los inhibidores de la bomba de protones (IBP), que reducen la inflamación y alivian los síntomas.	Se puede controlar sus síntomas con dieta, manejo del estrés, probióticos y antiespasmódicos, laxantes, antidiarreicos y antidepresivos tricíclicos.	El tratamiento para las úlceras pépticas (úlceras gástricas) se basa en el uso de medicamentos antiinflamatorios, como los inhibidores de la bomba de protones (IBP).