



Docente: Toledo López Mayela

Carrera: Medicina Humana

Alumno: Deyler Antoni Hernandez Gutiérrez

Materia: Nutrición

Semestre: 3 B

Fecha entrega: 06/09/2023

CUADRO COMPARATIVO SOBRE PATOLOGIAS DEL SISTEMA DIGESTIVO

ERGE	COLITIS ULCEROSA	SX COLON IRRITABLE	ULCERA
Mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior lo que provoca salida del ácido estomacal	La colitis ulcerosa es una enfermedad crónica común que causa inflamación en el colon. Es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal similar a la enfermedad de Croh	El colon irritable, cuya denominación más exacta es «Síndrome del Intestino Irritable» (SII), es un cuadro crónico y recidivante, caracterizado por la existencia de dolor abdominal y/o cambios en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento)	La ulcera es una lesión profunda en la piel o en una membrana mucosa, como el estómago y la boca
El alcoholismo y tabaquismo predisponen dicho padecimiento	Se presentan síntomas de dolor abdominal, y el primer síntoma de la colitis ulcerosa suele ser diarrea, heces blandas y algunas personas pueden experimentar calambres	Se puede acompañar o no de una sensación de distensión abdominal, sin que se demuestre una alteración en la morfología o en el metabolismo intestinal	Pueden ser causadas por inflamación, infección, golpe o cáncer, o por el desgaste de la capa protectora de la mucosa
El embarazo es un punto a tomar muy en cuenta a la hora de este diagnóstico y su tratamiento	No hay causas exactas, pero interviene la genética, los factores ambientales, método de respuesta	Este tipo de dolor es difuso, sus inicios se asocian con ganas de defecar	El síntoma más común de una ulcera es la presencia de dolor lo que ha de variar dependiendo de su localización tamaño y gravedad de la lesión, puede haber presencia de nauseas, acidez, falta de apetito, o sangrado
Sus síntomas mas comunes son; la acidez, nauseas posterior a comer, acidez gástrica	Los factores de riesgo incluyen edad, etnia, genética, diagnostico	Sus síntomas son dolor abdominal, distensión abdominal Alteración del ritmo intestinal Meteorismo	El tipo mas frecuente de ulceras es la ulcera péptica que afecta el estómago o el duodeno

Comentado [DH1]:

<p>Síntomas menos comunes: hipo, dificultad para deglutir, dolor de garganta</p>	<p>Su tratamiento se enfocará en mantener la remisión para prevenir los síntomas y controlar un brote hasta que los síntomas entre remisión</p>	<p>Se puede evitar con la ingesta de la cafeína (que se encuentra en el café, los té, y los refrescos).</p> <p>Aumenta la fibra en tu dieta</p> <p>Bebe de tres a cuatro vasos de agua al día.</p> <p>No fumes.</p> <p>Hacer ejercicio</p>	<p>La cirugía como tratamiento quedo reservada para pocas situaciones en las que exista complicaciones</p>
<p>Su tratamiento se basa en neutralizar el ácido del estómago, medicamentos que bloquean la producción de ácido y cicatrización del esófago</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fármacos incluye: • antagonistas del TNF-α, • agentes anti-integrina • inhibidores de la cinasa de • antagonistas de la interleucina 12/23 	<p>Dolor, calambres o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal</p> <p>Cambios en el aspecto de las deposiciones</p> <p>Cambios en la frecuencia con la que se hacen las deposiciones</p>	<p>Su tratamiento se basa en antiácidos, antagonistas de los receptores H2, agentes protectores de la mucosa, prostaglandinas sintéticas, inhibidores de la bomba de protones</p>