



Supernota

Nombre del Alumno: José Francisco Pérez Pérez

Nombre del tema: Fases de trabajo de parto

Parcial: 4to

Nombre de la Materia: Metodología de la investigación

Nombre del profesor: Dra. Iris Mayela Toledo Lopez



Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

7° semestre

FASES DEL TRABAJO DE PARTO

Fase 1

Comenzando incluso antes de la implantación, se impone un periodo notablemente efectivo de inactividad del miometrio. Esta fase 1 por lo usual comprende 95% del embarazo y se caracteriza por la tranquilidad del músculo liso uterino con el mantenimiento de la integridad estructural cervical



FASE 2

Para prepararse para el trabajo de parto, la inactividad miométrial de la fase 1 del parto debe suspenderse, lo que se conoce como despertar o activación uterina. Esta fase 2 del parto es una progresión de los cambios uterinos durante las últimas semanas del embarazo. Es importante destacar que los cambios de eventos asociados con la fase 2 pueden causar parto prematuro o retrasado.

Fase 3

TRABAJO DE PARTO

Fase 4 PUERPERIO

Inmediatamente y durante casi 1 hora después del parto, el miometrio permanece persistentemente contraído. Esto comprime de manera directa los grandes vasos uterinos y permite la trombosis de su luz para evitar la hemorragia

BIBLIOGRAFIA

F. Gary Cunningham, MD, Kenneth J. Leveno, MD, Steven L. Bloom, MD, Jodi S. Dashe, MD, Barbara L. Hoffman, MD, Brian M. Casey, MD, Catherine Y. Spong, MD – 2019 – WILIAMS OBSTETRICIA – 25 edición - edición en español por, McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORE