

Nombre	Dosis	Vía	Zona	Edad
BCG	0.1 ml	Intradérmica	Cara externa superior del brazo (en la región superior de la inserción distal del músculo deltoide)	Al nacer
Hepatitis B	0.5 ml	Intramuscular	Muslo izquierdo	<ul style="list-style-type: none"> • Al nacer • A los 2 meses • 6 meses
Pentavalente	0.5 ml	Intramuscular	Tercio medio de la región anterolateral externa del muslo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 meses • 4 meses • 6 meses • 18 meses
DPT	0.5 ml	Intramuscular	En el musculo deltoides del brazo izquierdo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 meses • 4 meses • 6 meses • 18 meses • Refuerzo a los 4 años
Rotavirus	2 ml	Oral	Boca	<ul style="list-style-type: none"> • 2 meses • 4 meses • 6 meses
Neumococica	0.5 ml	Intramuscular	Tercio medio de la región anterolateral externa del muslo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 meses • 4 meses • 12 meses
Influenza	0.5 ml	Intramuscular	Brazo izquierdo	<ul style="list-style-type: none"> • 6 meses • 7 meses • Anual
SRP	0.5 ml	Intramuscular	Brazo izquierdo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 año • Refuerzo a 6 años
Sabin	2 gotas	Oral	Boca	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionales