



Efraín de Jesús Gordillo García.

Cuadros comparativos.

Sexualidad Humana

3°A

PASIÓN POR EDUCAR

desarrollo fetal por trimestre.

<p>Primer trimestre (Semanas 1 a 12)</p>	<p>Semana 1 y 2: Puede parecer extraño, pero en realidad no estás embarazada la primera semana o las primeras dos semanas del tiempo asignado a tu embarazo.</p> <p>Semana 3: el embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 centímetros</p> <p>Semana 4: la cabeza se desarrolla de manera considerable Se comienza a formar el sistema nervioso central y se pueden observar los inicios de ojos y orejas, La columna vertebral se construye para finales de la cuarta semana.</p> <p>De la 4 a 8 semana: se desarrollan las partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies</p> <p>Semana 7: Para finales de la séptima semana, se han formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino, y ya han empezado a funcionar de manera limitada</p> <p>Semana 10: el embrión no sólo tiene un conjunto completo de dedos, sino que también tiene uñas.</p> <p>Semana 12: el feto es indudablemente humano y parece un pequeño lactante. Mide cerca de 10 centímetros, y pesa aproximadamente 19 gramos, A partir de este momento, el desarrollo consiste principalmente del crecimiento y diferenciación de estructuras que ya se encuentran presentes.</p>
<p>Segundo trimestre</p>	<p>Semana 14: se pueden detectar movimientos del feto</p> <p>Semana 18: la mujer ha podido sentir los movimientos durante dos a cuatro semanas, y el médico puede detectar el latido cardiaco del feto.</p> <p>Semana 20: El feto abre sus ojos por primera vez</p>

	<p>Semana 24: es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in útero</p> <p>En este momento, los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño.</p>
<p>Tercer trimestre</p>	<p>Al principio del tercer trimestre, se forman depósitos de grasa por debajo de la piel; estos le darán al lactante la característica apariencia regordeta de los bebés</p> <p>Se pierde el vello sedoso</p> <p>Durante el séptimo mes, el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza</p> <p>Si esta rotación no ocurre para el momento del parto, habrá una presentación de nalgas</p> <p>El crecimiento del feto durante los últimos dos meses es veloz</p>

**cambios físicos y psicológicos maternos:
(cambios físicos)**

<p style="text-align: center;">Primer trimestre</p>	<p>LAS MAMAS SE INFLAMAN Y HORMIGUEAN LOS PEZONES Y AREOLA PUEDEN OSCURECERSE Y AMPLIARSE NÁUSEAS MATUTINAS SENTIMIENTOS DE NÁUSEA VÓMITO AUMENTO EN NIVELES HORMONALES ORINAR CON MAYOR FRECUENCIA AUMENTO EN LOS EXUDADOS VAGINALES LOS SENTIMIENTOS DE FATIGA Y SUEÑO</p>
<p style="text-align: center;">Segundo trimestre</p>	<p>ESTREÑIMIENTOS SANGRADOS NASALES LA MUJER SE CONCIENTIZA DE LOS MOVIMIENTOS DEL FETO SALE CALOSTRO EN PEZONES LAS INCOMODIDADES SE MINIMIZAN LA MUJER SE CONCIENTIZA DE LOS MOVIMIENTOS DEL FETO EDEMA E INFLAMACIÓN EN CARA, MANOS, MUÑECAS, TOBILLOS Y PIES.</p>
<p style="text-align: center;">Tercer trimestre</p>	<p>EL ÚTERO ES MUY GRANDE Y DURO PRESIÓN SOBRE LOS PULMONES, LO QUE CAUSA FALTA DE RESPIRACIÓN EL ESTÓMAGO SE OPRIME Y LA INDIGESTIÓN SE VUELVE COMÚN EL OMBLIGO SE VE EMPUJADO HACIA FUERA EL CORAZÓN SE ENCUENTRA BAJO TENSIÓN A CAUSA DEL AUMENTO EN VOLUMEN SANGUÍNEO AUMENTO DE PESO</p>

**cambios físicos y psicológicos maternos:
(cambios físicos)**

Primer trimestre	<p><u>EVENTOS ESTRESANTES TALES COMO:</u> MUDARSE DE CASA, CAMBIOS EN SUS EMPLEOS, CAMBIOS EN SUS RELACIONES, ENFERMEDADES PASA DE ESTAR MUY FELIZ A LA DEPRESIÓN Y EL LLANTO DISPONIBILIDAD DE APOYO SOCIAL SU ACTITUD HACIA EL EMBARAZO LOS BAJOS INGRESOS</p>
Segundo trimestre	<p>ES UN PERIODO DE CALMA Y BIENESTAR RELATIVOS DISMINUYE EL TEMOR DE UN ABORTO ESPONTÁNEO EXISTEN MENOS PROBABILIDADES DE DEPRESIÓN SI LA MUJER TIENE UNA PAREJA AS MUJERES QUE HAN TENIDO EMBARAZOS ANTERIORES SE ENCUENTRAN MÁS ANGUSTIADAS DURANTE</p>
Tercer trimestre	<p>MISMOS SINTOMAS QUE EL TRIMESTRE PASADO MENORES NIVELES DE ANSIEDAD E INSOMNIO BIENESTAR WN MUJERES QUR CUENTAN CON APOYOSOCIAL</p>

signos presuntivos, probables, y confirmatorios:

Signos presuntivos	La amenorrea Sensibilidad de las mamas Náusea
Signos probables	Aumento de volumen abdominal Percepción de movimientos fetales
Signos confirmatorios	Latido del corazón fetal Movimiento fetal activo Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido

REFERENCIAS:

p. 135: ©Dr. Landrum B. Shettles; p. 139 (superior izquierda): ©Petit Format/Nestle/Science Source/Photo Researchers; p. 139 (superior derecha, inferior izquierda y derecha): Lennart Nilsson, tomado de *A Child is Born*, Dell Publishing Company; p. 143: ©Spencer Grant/Photo Researchers; p. 146 (izquierda): Streissguth, A.P., Landesman-Dwyer, S., Martin, J.C., & Smith, D.W. (1980). "Teratogenic effects of alcohol in humans and laboratory animals," *Science*, 209, 353–361; p. 146 (derecha): ©John Chiasson/Gamma Liaison/Getty; p. 148 (arriba): ©D. Van Rossum / Petit Format / Photo Researchers, Inc.; p. 148 (abajo): ©O.V.N. / Petit Format / Photo Researchers, Inc.; p. 151: ©Lawrence Migdale / Photo Researchers, Inc.; p. 153 (izquierda): ©Byron/Monkmeyer/Photo Researchers; p. 153 (derecha): ©Byron/Monkmeyer/Photo Researchers; p. 156: ©Digital Vision/Getty; p. 163: ©Hulton-Deutsch Collection/ Corbis; p. 164: (arriba) ©ISM / Phototake; p. 164: (abajo) ©Paltera Stefano/Gamma.