



CESAR FELIPE MORALES SOLIS

**DRA. MARIANA CATALINA SAUCEDO
DOMINGUEZ**

CUADROS COMPARATIVOS

SEXUALIDAD HUMANA

PASIÓN POR EDUCAR

3

A

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Octubre de 2023.

CUADRO COMPARATIVO DEL DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

	Primer trimestre	SEMANAS	Segundo Trimestre	SEMANAS.	Tecer Trimestre
SEMANAS	Desarrollo más notable que en segundo y tercer trimestre	Final de 14ava SDG	AVIVAMIENTO	principio del tercer trimestre	se forman depósitos de grasa por debajo de la piel; estos le darán al lactante la característica apariencia regordeta de los bebés
	Pequeña masa de células se transforma en un feto	18 SDG	Mujer puede sentir los movimientos fetales durante 2 a 4 semanas y detección del latido cardíaco por parte del médico	Durante el séptimo mes	el feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza
3 SDG	El embrión parece un pequeño trozo de carne	20 SDG	El feto abre sus ojos	Al final del octavo mes	pesa, en promedio, 2 500 gramos y mide 50 centímetros
	Mide cerca de 0,2 cm (1/2 pulgada)	24 SDG	Sensible a la luz y puede escuchar sonidos in utero. Movimiento de brazos y piernas es vigoroso. El feto alterna entre periodos de vigilia y sueño		
ENTRE 3a y 4a SDG	Desarrollo de la cabeza considerable	FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE	la piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso		
	Desarrollo del SNC, inicios del ojo y orejas	fs	Tema principal 1 2		
Finales de 4a SDG	Constitución de la columna vertebral		Tema principal 1 2		
FINALES DE 7a	Formación de hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y FN limitada		Tema principal 1 2		
8a SDG	Desaparición de la "cola" embrionaria		Tema principal 1 2		
ENTRE LA 4a y 8a SDG	DESAPARICIÓN DE PARTES CORPORALES EXTERNAS; OJOS, OREJAS, BRAZOS, MANOS, DEDOS, PIES Y DEDOS DE LOS PIES		Tema principal 1 2		
FINAL DE LA 10a SDG	Conjunto completo de dedos, y uñas		Tema principal 1 2		
12 SDG	Formación de gonadas pero el sexo no es visible hasta la semana 12		Tema principal 1 2		
Finales de la 12ava SDG	Feto ineludiblemente humano y parece un pequeño lactante. mide cerca de 10 cm y pesa aprox 19 gr		Tema principal 1 2		

Tema central

primer trimestre

El segundo trimestre (semanas 13 a 26)

El tercer trimestre (semanas 27 a 38)

El primer trimestre

El segundo trimestre (semanas 13 a 26)

El tercer trimestre

F

elevado aumento en niveles hormonales

Durante el cuarto mes, la mujer se concientiza de los movimientos del feto

el útero es muy grande y duro

P

Según un punto de vista, se supone que el embarazo es un periodo de felicidad y calma

es un periodo de calma y bienestar relativos

bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con un apoyo social

I

especial de estrógeno y progesterona, producidos por la placenta

Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre tales como náuseas matutinas, y las incomodidades se minimizan.

El tamaño extremo del útero ejerce presión sobre otros órganos, lo que ocasiona cierta incomodidad

S

Se dice que una satisfacción radiante, el "resplandor del embarazo" emana de la cara de la mujer y que éste es un buen momento para que la fotografíen.

Disminuye el temor de un aborto espontáneo a medida que la mujer siente los movimientos del feto

que tienen mayores ingresos/pertenecen a la clase media, y que experimentan menos sucesos vitales estresantes concurrentes

S

Las mamas se inflaman y hormiguean

incluyen estreñimientos y sangrados nasales

falta de respiración

I

El estado emocional de una mujer durante el embarazo, que con frecuencia se evalúa por medio de mediciones de depresión, varía según una multitud de factores

Existen menos probabilidades de depresión durante el segundo trimestre si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella

Las mujeres que informaron de un menor apoyo durante el embarazo se encontraron en mayores probabilidades de tener bebés con bajo peso al nacer

I

Los pezones y el área que los rodea (areola) pueden oscurecerse y ampliarse

Es posible que el edema

El estómago también se oprime y la indigestión se vuelve común

C

las mujeres que desean el embarazo se encuentran menos ansiosas que las mujeres que no lo desean

los sentimientos de cuidado o de interés materno por el lactante aumentan progresivamente

menores niveles de ansiedad e insomnio durante el tercer trimestre

C

existe una necesidad de orinar con mayor frecuencia

es posible que un delgado líquido amarillo o ámbar llamado calostro salga de los pezones, aunque todavía no hay leche.

El ombligo se ve empujado hacia fuera

O

Un segundo factor es la clase social

Tema principal 1 6

O

El útero en crecimiento también contribuye al presionar en contra de la vejiga

El corazón se encuentra bajo tensión a causa del considerable aumento en volumen sanguíneo.

L

Las mujeres que llevaban una vida muy activa antes de embarazarse pueden hallar que la fatiga y la falta de energía son particularmente inquietantes

S

Algunas mujeres experimentan náuseas matutinas

En ocasiones, el útero se constriñe de manera dolorosa en las llamadas contracciones de Braxton-Hicks

O

sentimientos de náusea, tal vez hasta llegar al vómito, y repulsión hacia la comida o hacia su olor

Tema principal 1 2

G

es posible que aumenten los exudados vaginales

I

C

O

S

SIGNOS DEL EMBARAZO

SIGNOS PRESUNTIVOS

SIGNOS PROBABLES

SIGNOS POSITIVOS

La amenorrea

Aumento de volumen abdominal

Latido del corazón fetal

Sensibilidad de las mamas

Percepción de movimientos fetales

Movimiento fetal activo

Náusea

Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido

BIBLIOGRAFIA:

Spencer A. Rathus, Jeffrey S. Nevid. Louis Fichner-Rathus. (2005). Sexualidad Humana, 6ª edición.
Editorial PEARSON PRENTICE HALL.