

Javier Adonay Cabrera Bonilla


Karen Alejandra Morales Moreno


Fisiopatología II

Mapas conceptuales


3°


“B”







Barreira mucosa gastrica









Síndrome del intestino irritable

Definición

Alteración en la función normal del tubo digestivo

Combinación variable de síntomas intestinales crónicos y recurrentes

No se explican por anomalías estructurales

Síntomas persistentes y recurrentes de dolor abdominal

Clinica

Dolor molestia abdominal

Flatulencias distensión abdominal

Nauseas anorexia extrínica diarrea Depresión

Puercaciones anormales

Peso tenso

Diagnostico

Se basa en la presencia de Sígnos y Síntomas

Sígnos continuos recurrente por lo menos 12 horas

Tratamiento

medidas de control de estres


evitar alimentos dañinos

omitir grasas, alimentos productores de gases alcohol y cafeina

espasmodicos Antirraisergericos

Alsebol

Enfermedad intestinal inflamatoria



Incomplete

Enterocolitis infecciosa

Definición

Afectaciones del tubo digestivo por agentes microscópicos que causan diarrea y úlceras

Se diseminan por vía fecal-oral.

Infección vírica

Afección en epitelio superficial intestinal

Destrucción de células y alterando su absorción

Rotavirus

Infección bacteriana

por diferentes bacterias

Mecanismos patogénicos como la ingestión de toxinas

mas grave que las víricas

pre de provocar pérdida de líquidos

Clostridium difficile

Escherichia coli

Infección por protozoarios

Amibiasis, afección de colon C. En forma de quistes (quistos)

Diarrea al inicio agudo (8 días)


pre de tener A Sintomas tras horas o años (cáncer hepáticas)

pre de tener Sensibilidad al tacto, calos y fiebre

en diagnóstico pre de hacer una vez de microscopio colélico

completo





30-11-23
 Winkler
 27/11/23

Javier Cabrera

Apéndice


Definición
Ostrucción intraluminal del apéndice
El apéndice se inflama, edematiza y gangrena

Epidemiología
Apéndice usada en estados Unidos
Hombres tienen 12% de riesgo
Mujeres tienen 25% de riesgo


Clinica
Inicio abrupto
Periumbilical
Dolor postprandial
Flemitis
1-2 episodios de náuseas
Dolor viscerocólico (2-12h)
Dolor en el cuadrante inferior derecho
Puede haber leucocitosis
Puede haber dolor cala depresión


Diagnóstico
Se busca generalmente en los síntomas
Hallazgos a la exploración física
Hallazgo de neutrofilia
Ecografía
Tomografía para confirmar diagnóstico

Tratamiento
Resección quirúrgica del apéndice
Peritonitis
Absceso apendicular
Septicemia



10





Referencia:

Tommie L. Norris (2020). fisiopatología de porth. alteraciones de la salud. Principios básicos. Alteraciones de la función gastrointestinal.pag.1083-1100.10 edición. wolters kluewer editorial.