



**Nombre del alumno: Tania Elizabeth Martínez  
Hernández**

**Nombre del profesor: DR. Miguel Abelardo  
Ortega Sánchez.**

**Nombre del trabajo: Cuadro de la  
clasificación de la FDA**

**Materia: Farmacología**

**Grado: 3°**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de octubre del 2023

<b>Clasificación</b>	<b>Definición</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Tipos de medicamentos</b>
<b>Categoría A</b>	Puede emplearse. Los estudios no demuestran riesgo para el feto en el primer trimestre y la posibilidad de lesión fetal parece remota.	No han demostrado ningún tipo de riesgo para el feto. Sustancias cuyo uso en el embarazo es seguro.	Levotiroxina. Ácido fólico. Vitamina D. Vitamina B, 12. Vitamina B, 6 vitamina B 1. Acido nicotínico. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de aluminio. Sulfato ferroso
<b>Categoría B</b>	Probablemente seguro. Los estudios de reproducción realizados en animales, no indican riesgos para el feto, pero no existen estudios controlados en mujeres embarazadas, o bien los estudios de reproducción en animales si han demostrado efectos adversos, pero no han sido confirmados en estudios controlados sobre gestantes en el primer trimestre.	No existe riesgo evidente en los trimestres posteriores.	Ampicilina. Amoxicilina. Anfotericina B azitromicina. Cefazolina. Cefraclor Cefotaxima. Ceftriaxona. Cefuroxima. Clindamicina. Clorfeniramina. Diclofenaco. Clortalidona. Difenhidramina. Dimnehidrinato. Eritromicina. Hidroclorotiazida. Ibuprofeno Indometacina. Metformin. Metildopa metoclopramida. Metronidazol. Naproxeno. Nitrofurantoína. Paracetamol. Penicilina G. Penicilina procaínica. Penicilina benzatinica. Ranitidina. Terbinafina.

			<p>Acarbosa.  Acetilcisteína.  Algendrato.  Almagato.  Amiloride.  Bacampicilina.  Bencilpenicilina.  Bromocriptina.  Brupropion.  Cartinina.  Cefepime.  Cefixima.  Cefprozilo.  Cefradina.  Ceftazidima.  Ceftibuteno.  Cetirizina.  Cimetidina.  Cleboprida.  Clemastina.  Clindamicina.  Clorhexidina.</p>
<b>Categoría C</b>	<p>Evitarlo si existe otra alternativa. Los estudios realizados en animales han revelado efectos adversos en el feto, Pero no existen estudios realizados en mujeres ni en animales. Los fármacos sólo se administran si el beneficio potencial que justifica el riesgo potencial para el feto.</p>	<p>No puede descartarse riesgo fetal.</p>	<p>Amitriptilina  Baclofeno.  Bromocriptina  Budenosida.  Claritromicina  ciprofloxacina.  Dexametasona.  Diltiazem  Dopamina.  Efavirenz.  Enalapril  Gentamicina.  Glibneclamida.  Heparina.  Haloperidol.  Interferón Alfa.  Isonicacida.  Ketoconazol.  Levodopa.  Mebendazol.  Menadiona.  Morfina.  Nifedipina.  Pentoxifilina.  Pioglitazona.  Piroxicam.</p>

			<p>Prednisolona.  Propranolol.  Rifampicina.  Salbutamol  Teofilina.</p>
<b>Categoría D</b>	<p>Evitarlo si existe otra alternativa. Existe evidencia positiva de riesgo para el efecto humano, pero se acepta su empleo en mujeres embarazadas a pesar del riesgo.</p>	<p>Sí hay indicios de riesgo fetal.</p>	<p>Atenolol.  Ácido acetilsalicílico  Alprazolam.  Amiodarona.  Bleomicina.  Clorazepato  Ácido valproico.  Bussulfan.  Captopril  Clortalidona.  Colchicina.  Clordiazepoxido.  Diazepan.  Dexametasona.  Diclofenaco.  Doxicilina. Enalapril.  Fenobarbital.  Hidroclorotiazida.  Imipramina.  Ibuprofeno.  Indometacina. Litio  Naproxeno  Piroxicam  Prednisolona.  Propranolol.  tetraciclina  Warfarina.</p>
<b>Categoría X</b>	<p>Contraindicado. Los estudios han demostrado alteraciones fetales o existe evidencia de riesgo fetal está contraindicado en mujeres que están o pueden estar embarazadas.</p>	<p>Contraindicados en el embarazo.</p>	<p>Atorvastatina.  Contraceptivos hormonales  Clomifeno.  Danazol.  Etritinato.  Etinilestradiol.  Estradiol.  Estrógenos conjugados.  Ergotamina.  Fluvastatina.  Flurazepam.  Isotretinoína  Mestranol.  Lovastatina.</p>

			Misoprostol. Menadiona. Medroxiprogesterona. Metotrexato. Mifepristona. Norgestrel. Noretisterona. Ribavirina. Sinvastatina. vitamina A
--	--	--	--

Fuentes bibliográficas: FJ Abad Jimeno, & Cabrera M. (2005). categorías de riesgo De los medicamentos utilizados durante el embarazo. Guía rápida de consulta FAP, 3,49-61.