

**Nahara Ageleth Figueroa Caballero**

**Dr. Miguel Abelardo Sánchez Ortega**

**Cuadro de la clasificación de la FDA**

**Farmacología I**

**3°**

**“B”**

| CATEGORÍA   | SEGURIDAD                                      | DESCRIPCIÓN   | FÁRMACOS DE USO FRECUENTE   |
|-------------|--|---|---|
| Categoría A | Estudios controlados no han demostrado riesgos | Estudios adecuados en embarazadas no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre, y tampoco hay evidencia de riesgo en el resto del embarazo. Son remotas las posibilidades de daño fetal.   | Ácido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, Vit. B1, B12, B6, C; (Vit. A es categoría A pero en altas dosis es X).   |
| Categoría B | No hay riesgos descritos para el feto humano   | Estudios en animales no han mostrado riesgo teratógeno; no hay estudios controlados en mujeres embarazadas o bien los estudios en animales han mostrado efectos secundarios no confirmados en mujeres embarazadas. Generalmente, se acepta el uso de estos medicamentos.  | Amoxicilina/Ac. clavulánico, ampicilina/ sulbactam, cefalosporinas, cimetidina, eritromicina, clindamicina, clotrimazol, metronidazol, nitrofurantoina, insulina, ranitidina, dimenhidrinato, cetirizina, (ketoprofeno, es B 1er y 2do T; D en el 3er T).   |
| Categoría C | No puede descartarse riesgo fetal.             | Estudios sobre animales han mostrado efectos secundarios fetales (teratógenos, embriocidas u otros). sin que existan estudios controlados en mujeres gestantes; o no se dispone de estudios en animales ni en mujeres. Estos fármacos se utilizarán solo en caso de que los beneficios superen a los potenciales riesgos fetales. | Amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, claritromicina, cotrimoxazol, isoniazida, ambroxol, dexametasona, dextrometorfano, (codeína C 1er y 2do T; D 3er T, y en dosis prolongadas); diclofenaco, ketorolaco; (celecoxib y naproxeno C 1er y 2do T; D 3er T); (AAS, es C 1er y 2do T; D 3er T ó altas dosis); (captopril C 1er T; D 2do y 3er T). |
| Categoría D | Hay indicios de riesgo fetal                   | A veces los posibles beneficios del fármaco pueden ser aceptables a pesar del riesgo (por ejemplo, si el fármaco se requiere para tratar una enfermedad que amenaza la vida, o una enfermedad grave para la que no pueden usarse otros fármacos más seguros).   | Alprazolam, diazepam, carbamazepina, estreptomina, fenitoina, fenobarbital.   |
| Categoría F | Contraindicados en el embarazo                 | Tanto los estudios en animales como en humanos han puesto de manifiesto evidentes riesgos para el feto que superan claramente cualquier beneficio.  | Atorvastatina, clomifeno, anticonceptivos orales combinados y hormonoterapia de reemplazo, desogestrel, etinilestradiol, Warfarina, vitamina A en altas dosis.  |

## Referencia bibliográfica

Bertram G. Katzung . (2007). *farmacologia basica clinica* . bogota colombia .

